

GUIDE DE LA TARIFICATION INDIVIDUELLE

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



assurances vie et maladie complémentaire

À PROPOS DE L'ÉQUITABLE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE DU CANADA^{MD}



L'Assurance vie Équitable compte parmi l'une des compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada. Depuis des générations, nous fournissons une protection financière avisée à nos titulaires de contrat et sommes heureux à l'idée de pouvoir continuer à leur assurer une valeur financière à long terme. Nous veillons à satisfaire les besoins de notre clientèle et sommes fiers de la gamme et de la qualité de nos produits financiers et d'assurance de même que de notre service à la clientèle de premier ordre.

Le fait que notre compagnie soit une mutuelle d'assurance fait en sorte que nos titulaires de contrat avec participation en sont les propriétaires et ont droit de vote lors des assemblées. En outre, ne comptant aucune actionnaire ou aucun actionnaire exigeant une importance excessive sur les gains à court terme, l'Assurance vie Équitable œuvre dans l'intérêt véritable de ses titulaires de contrat.

L'Assurance vie Équitable est une compagnie stable et solide et sait maintenir son cap.

Le principe de la mutualité est un élément clé de notre proposition de valeur, de concert avec notre portefeuille de produits diversifié et notre service de premier ordre. Nous sommes une entreprise progressive, concurrentielle et fermement engagée à servir les intérêts de nos titulaires de contrat en leur offrant des stratégies à long terme qui favorisent la stabilité, la croissance et la rentabilité.

À PROPOS DE CE GUIDE

Le présent guide vous fournit un aperçu illustrant la façon dont les cas les plus fréquents ayant des exigences médicales et ceux sans exigence médicale peuvent influencer les décisions prises en tarification :

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Contexte de base pour chaque cas. | <ul style="list-style-type: none"> Énumération des éléments clés ayant une influence sur les décisions prises en tarification. | <ul style="list-style-type: none"> Indication de la décision probable relative à la tarification pour un cas précis et ne garantit pas qu'une offre peut être effectuée. Les décisions réelles reposeront sur l'évaluation de toutes les sources de renseignements nécessaires pour chaque proposante ou proposant selon son cas individuel. | <ul style="list-style-type: none"> Précisions sur les renseignements qui peuvent être obtenus pour les affections nécessitant des exigences médicales, comme la déclaration du médecin traitant, et fournis par la proposante ou le proposant pour les affections sans exigence médicale. Si ces renseignements ne sont pas fournis ou sont incomplets, des rapports subséquents peuvent être exigés et pourraient retarder la décision prise en tarification. |

En plus des renseignements concernant les cas nécessitant des exigences médicales et ceux sans exigence médicale, le guide comporte également les lignes directrices sur la tarification financière, les renseignements sur le statut tabagique pour chaque produit, ainsi que des renseignements au sujet du programme **incitatif d'abandon du tabac**.



| | | |
|---|--|----|
| À propos de l'Assurance vie Équitable du Canada^{MD}3 | Dépression | 14 |
| À propos de ce guide | Diabète..... | 15 |
| Renseignements utiles à recueillir pour tous les cas nécessitant des exigences médicales | Drogues illicites | 15 |
| Propositions préliminaires..... | Emphysème | 16 |
| Décisions de tarification | Endobrachyoœsophage | 16 |
| Vous avez des questions? | Épilepsie/crise épileptique | 16 |
| Risques médicaux | Fibrillation auriculaire/flutter auriculaire..... | 17 |
| Accident vasculaire cérébral | Hépatite..... | 17 |
| Accidentsischémique transitoire (AIT)..... | Hypertension artérielle | 18 |
| Anémie | Infarctus du myocarde/crise cardiaque/ thrombose coronaire..... | 18 |
| Anévrisme | Maladie coronarienne | 18 |
| Angine de poitrine | Maladie d'Alzheimer..... | 19 |
| Antécédents familiaux | Maladie de Crohn | 19 |
| Anxiété | Polyarthrite rhumatoïde..... | 19 |
| Apnée/apnée du sommeil/ apnée obstructive du sommeil (AOS) | Pontage coronarien | 20 |
| Artériosclérose..... | Proposants âgés | 20 |
| Athérosclérose..... | Risques non médicaux | 21 |
| Asthme | Aviation commerciale | 21 |
| Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)..... | Aviation privée | 21 |
| Cancer : carcinome basocellulaire | Aviation sportive | 21 |
| Cancer : de la peau, à la limite de la malignité ... | Course de véhicule automobile..... | 22 |
| Cancer : de la peau; malin | Conduite automobile | 22 |
| Cancer : de la prostate..... | Escalade..... | 22 |
| Cancer : de la thyroïde..... | Immigration..... | 23 |
| Cancer : du poumon | Plongée avec scaphandre autonome | 23 |
| Cancer : du sein..... | Voyage missionnaire..... | 23 |
| Cancer : leucémie | Lignes directrices sur la tarification financière | 24 |
| Cardiopathie congénitale..... | Définitions relatives au statut tabagique | 25 |
| Chirurgie bariatrique | Produits Équation Génération, ÉquiVU, Équimax et AMG ÉquiVivre..... | 25 |
| Colite ulcéreuse..... | Régimes et avenants d'assurance vie temporaire ... | 25 |
| Consommation ou abus d'alcool..... | Programme incitatif d'abandon du tabac | 26 |
| Crise | Comment ça fonctionne | 26 |
| | Vous avez des questions? | 26 |

RENSEIGNEMENTS UTILES À RECUEILLIR POUR TOUS LES CAS

1. Date du diagnostic
2. Âge de la proposante ou du proposant à la date du diagnostic
3. Médicaments, posologie et traitements associés prescrits
4. Tout arrêt de travail
5. Toute hospitalisation
6. Coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement
7. Date et résultats du dernier suivi et examens médicaux
8. Tout test ou examen en attente
9. Statut tabagique actuel
10. Date et précisions sur la dernière occurrence des symptômes, des épisodes ou des poussées actives

L'importance de fournir des renseignements complets

Fournir des renseignements complets sur les cas nécessitant des exigences médicales ou ceux sans exigence médicale permet d'assurer une évaluation précise de façon aussi rapide et efficace que possible. Lorsque des questionnaires sont exigés, ils doivent être dûment remplis et signés par la proposante ou le proposant. Les questionnaires disponibles comprennent les suivants :

- Questionnaire relatif à la consommation d'alcool
- Questionnaire relatif aux troubles nerveux
- Questionnaire relatif à l'aviation
- Questionnaire relatif à l'escalade
- Questionnaire financier confidentiel - Couverture individuelle
- Questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome
- Questionnaire relatif au parachutisme et au saut en chute libre
- Questionnaire relatif à l'usage de drogues
- Questionnaire relatif aux conditions respiratoires
- Questionnaire relatif aux sports motorisés
- Questionnaire relatif aux voyages et à la résidence à l'étranger

PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Des propositions préliminaires peuvent être présentées afin de déterminer l'admissibilité avant de prendre les mesures nécessaires à la tarification des preuves médicales. Lorsque vous présentez des propositions préliminaires, veuillez inscrire « proposition préliminaire » dans la section intitulée « Directives spéciales » de la proposition d'assurance et fournir les coordonnées complètes, y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la médecin ou du médecin traitant.

DÉCISIONS DE TARIFICATION

L'équipe de tarification acceptera, refusera ou reportera la décision. Si la proposition d'assurance de votre cliente ou de votre client est :

- **ACCEPTÉE**, une offre d'assurance est présentée selon une catégorie de risques standard ou une catégorie de risques aggravés. La catégorie de risques aggravés (souvent désignée comme une catégorie de risques spéciale) peut donner lieu à une tarification qui augmentera les primes d'un multiple allant de 150 à 350 %.
- **REFUSÉE**, la proposante ou le proposant a été jugé comme étant non assurable et aucune offre d'assurance n'est présentée.
- **REPORTÉE**, une offre d'assurance à la proposante ou au proposant peut être considérée à une date ultérieure.

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS?

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régional(e) en marketing de l'assurance vie individuelle ou encore votre représentante ou votre représentant de l'Équitable. Vous pouvez également présenter vos demandes de renseignements concernant la tarification à l'adresse indnewbus@equitable.ca.

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|--|---|
| <p>Accident vasculaire cérébral</p> <p>Un accident vasculaire cérébral est caractérisé par une interruption du débit sanguin dans toute partie du cerveau causant un dommage permanent. Il peut être causé par une hémorragie, un événement vasculaire ou une thrombose.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel et âge à l'apparition • nombre d'épisodes • type de traitement • statut tabagique • étendue de tout effet résiduel ou déficit neurologique • tout facteur de risque supplémentaire pour la santé | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge à l'apparition • la cause • le type <p>Dans un délai d'un an suivant l'accident vasculaire cérébral :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposants plus jeunes • épisodes récents • statut tabagique • autres facteurs de risque pour la santé p. ex. diabète, hypertension | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dates et cause de chaque épisode • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits incluant les dates • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • arrêt de travail en raison de cette condition • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Accident ischémique transitoire (AIT)</p> <p>Un AIT se caractérise par un épisode de dysfonction neurologique ne durant pas plus que 24 heures et qui ne laisse aucun effet résiduel ou dommage permanent.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de traitement • médicaments et posologie prescrits • nombre d'épisodes • statut tabagique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge • la date des crises • le statut tabagique <p>Dans un délai de six mois suivant la crise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • autres facteurs de risque pour la santé, comme le diabète et l'hypertension | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date et nombre de crises • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • arrêt de travail lié à cette affection • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Anémie</p> <p>L'anémie ferriprive est la forme la plus courante et se définit par une réduction des globules rouges dans le sang.</p> <p>L'anémie est parfois causée par une perte de sang, l'incapacité de la moelle osseuse à produire un nombre suffisant de globules, ou une destruction prématurée des globules.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type d'anémie • cause de l'anémie si connue • précisions sur tous les examens effectués ou toute recommandation d'une consultation avec des spécialistes (inclure des dates, le nom des tests et des spécialistes consultés) • résultats des analyses de sang • traitement actuel et précédent • type de médicament pris actuellement ou précédemment • tout handicap coexistant | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'anémie <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • privilégiée, privilégiée plus, standard jusqu'au refus <p>Anémie ferriprive, examinée à fond et aucune affection sous-jacente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement taux standard <p>Anémie aplasique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • demande habituellement refusée <p>Anémie hémolytique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard à 200 % | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type et cause de l'anémie • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits • précisions sur la surveillance continue de l'affection, p. ex. des analyses de sang • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|---|--|---|
| <p>Anévrisme</p> <p>Les troubles de l'aorte comprennent les renflements (anévrismes) dans les endroits faibles de la paroi et la séparation des couches de sa paroi (dissection). Ces troubles peuvent être immédiatement fatals, mais ils prennent souvent plusieurs années à se développer. Des anévrismes peuvent également se développer dans d'autres artères.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type et endroit de l'anévrisme • date où il s'est produit • cause de l'anévrisme • taille et stabilité de l'anévrisme • état actuel • régulation de la pression artérielle • antécédents de tabagisme • tout traitement en cours | <p>Six mois après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération individuelle <p>Petit anévrisme abdominal sans chirurgie, taille de cinq cm ou moins s'étant maintenu au cours des trois dernières années ou depuis le diagnostic (s'il s'agit d'une période plus courte), stable avec un suivi régulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 à 200 % <p>Gros anévrisme abdominal sans chirurgie, taille de cinq cm ou plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Anévrisme abdominal avec chirurgie, minimum de six mois après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 à 250 % <p>Petit anévrisme cérébral sans chirurgie, taille d'un cm, minimum de six mois après le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarification déterminée selon les antécédents d'anévrisme <p>Gros anévrisme cérébral, sans chirurgie, taille de 1,9 cm ou plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Anévrisme cérébral avec chirurgie (de six mois à deux ans après chirurgie) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement taux de surprime, si aucune complication, considération d'un taux standard <p>Anévrisme thoracique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement un refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type, cause et taille de l'anévrisme • date du diagnostic • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits • précisions sur les examens à des fins de surveillance continue • précisions sur les modifications du style de vie • précisions sur les habitudes de tabagisme actuelles et précédentes • précisions sur la régulation de la tension artérielle et des lipides • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Angine de poitrine</p> <p>L'angine, également nommée « angine de poitrine », se caractérise par une douleur temporaire à la poitrine ou une sensation de pression qui survient lorsque le muscle du cœur ne reçoit pas assez d'oxygène.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Maladie coronarienne | <p>Reporter de six mois après le traitement initial, puis soumettre une proposition préliminaire.</p> | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|---|---|--|
| <p>Antécédents familiaux</p> <p>Antécédents familiaux de maladie polykystique des reins, de maladie de Huntington, de maladie du neurone moteur, du cancer du côlon et du sein des parents au premier degré peut constituer une préoccupation aux fins de tarification.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de maladie âge à l'apparition des membres de la famille plusieurs membres de famille souffrant de cette maladie | <p>Antécédents familiaux associés au cancer du sein, au cancer du côlon, à la maladie de Huntington, à la maladie du neurone moteur ou à la maladie polykystique constituent une préoccupation et d'autres preuves peuvent être exigées.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> remplir la section des antécédents familiaux de la proposition au complet, y compris le type de maladie, le lien avec la proposante et le proposant et l'âge à l'apparition date et résultats de tout dépistage génétique résultats de tout dépistage du cancer du côlon ou du sein |
| <p>Anxiété</p> <p>Les troubles anxieux impliquent un état de détresse, une nervosité chronique mais instable et se veut inopportunistement grave selon les circonstances de la personne.</p> | <ul style="list-style-type: none"> gravité actuelle de l'affection traitement actuel médicaments et posologie prescrits diagnostic d'un cas sévère ou chronique d'anxiété nombre de crises toute affection médicale ou psychiatrique coexistante (dépression, stress, etc.) antécédents d'abus d'alcool ou d'autres drogues | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gravité la fréquence <p>Anxiété légère :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard (une crise), à 150 % (plus d'une crise) <p>Anxiété modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard à 150 % (une crise), de 150 à 200 % (plus d'une crise) <p>Anxiété grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 % et plus (une crise) à 200 % et plus (plus d'une crise) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif aux troubles nerveux <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et traitements associés prescrits, et conformité impact de l'anxiété sur le style de vie et les activités journalières fréquence des symptômes précisions sur l'arrêt de travail en raison de cette affection antécédents de troubles psychiatriques, y compris les hospitalisations pour toute affection psychiatrique précisions sur toute consultation, notamment les dates et la durée précisions sur les facteurs médicaux coexistants date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Apnée/apnée du sommeil/apnée obstructive du sommeil (AOS)</p> <p>L'apnée du sommeil est un trouble grave qui se caractérise par des interruptions répétitives et brèves de la respiration dérangeant le sommeil et réduisent temporairement la quantité d'oxygène et augmentent la quantité de dioxyde de carbone dans le sang.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge de la proposante ou du proposant type d'apnée (obstructive, mixte ou centrale) gravité actuelle de l'affection traitement prescrit respect du traitement prescrit date de la dernière étude du sommeil taille et poids de la proposante ou du proposant toute affection médicale coexistante (hypertension artérielle, arythmie, etc.) antécédents de tabagisme | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gravité le traitement l'âge <p>Apnée légère, aucune complication actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>Apnée modérée, aucune présence de complication, traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 175 % <p>Aucun traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> 64 ans et moins : de 175 % jusqu'au refus 65 ans et plus : de 150 % jusqu'au refus <p>Apnée grave, traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 % jusqu'au refus <p>Apnée grave, aucun traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> dates et résultats de toutes les études du sommeil type et gravité de l'apnée médicaments, posologie et traitements associés prescrits, et conformité modifications du style de vie prescrites (actuelles et précédentes) précisions sur l'arrêt de travail en raison de cette affection statut tabagique, passé et actuel date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|---|--|---|
| <p>Artériosclérose</p> <p>L'artériosclérose est une affection qui se caractérise par des dépôts gras inégaux se développant dans les parois des moyennes et grosses artères, causant une réduction ou un blocage du débit sanguin.</p> | <p>Voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> maladie coronarienne accident vasculaire cérébral (AVC) accident ischémique transitoire (TIA) | <p>Reporter jusqu'à six mois après le traitement initial, puis soumettre une proposition préliminaire.</p> | |
| <p>Athérosclérose</p> <p>L'athérosclérose est un type précis d'artériosclérose, mais ces termes sont souvent utilisés de façon interchangeable. L'athérosclérose se caractérise par une accumulation de graisses sur les parois artérielles (plaques), qui pourrait restreindre le débit sanguin. Ces plaques pourraient éclater, causant un caillot sanguin.</p> | <ul style="list-style-type: none"> voir Maladie coronarienne | <p>Reporter jusqu'à six mois après le traitement initial, puis soumettre une proposition préliminaire.</p> | |
| <p>Asthme</p> <p>L'asthme est une affection où les voies respiratoires se rétrécissent - de façon réversible la plupart du temps - en réponse à certains stimulus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel date à laquelle le diagnostic d'asthme a été posé gravité des symptômes de l'asthme fréquence des symptômes et moment où ils se produisent précisions sur les médicaments et la posologie prescrits visites à l'hôpital en raison de cette affection respect de la prise du médicament et du traitement prescrits restrictions des activités de la vie quotidienne antécédents de tabagisme handicap coexistant, comme une BPCO, des troubles psychiatriques, un abus ou usage d'alcool, une maladie coronarienne, etc. | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge la gravité la fréquence le statut tabagique <p>Asthme léger ou intermittent - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard à 150 % <p>Asthme modéré - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 200 % <p>Asthme grave - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 200 à 250 % <p>Asthme intermittent ou léger persistant - de plus de 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> habituellement taux standard <p>Asthme modéré - plus de 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> habituellement refus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> fumer en plus de souffrir de l'asthme peut augmenter les taux. | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif aux conditions respiratoires <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> date du diagnostic symptômes augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes depuis le diagnostic dates, raison et résultats de toute hospitalisation ou visite à l'urgence en raison de cette affection dates de tout arrêt de travail en raison de cette affection médicaments, posologie et traitements associés prescrits respect du point précédent exigences de modifications du style de vie ou recommandations (abandon du tabac) résultats de tous les examens fonctionnels respiratoires description du niveau d'activité actuel antécédents familiaux de maladie respiratoire grave statut tabagique date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|---|--|
| <p>Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)</p> <p>La bronchopneumopathie chronique obstructive se caractérise par une obstruction persistante des voies respiratoires se produisant avec l'emphysème, la bronchite chronique ou les deux. Elle peut progresser et se détériorer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • antécédents de tabagisme et statut tabagique actuel • gravité des symptômes • traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • l'âge • le statut tabagique (actuel et au cours de la dernière année) • les facteurs de risque pour la santé supplémentaires, comme une maladie coronarienne, une bronchite ou de l'emphysème <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'au refus <p>Légère :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard à 150 % <p>Modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 175 à 250 % <p>Grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire relatif aux conditions respiratoires • date du diagnostic • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations ou traitements en salle d'urgence • date et résultats du dernier examen fonctionnel respiratoire • statut tabagique, passé et actuel • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : carcinome basocellulaire</p> <p>Le carcinome basocellulaire est un cancer qui se forme dans la couche superficielle de la peau (épiderme). Il ne se propage que très rarement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de cancer et stadification • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récurrence ou tout cancer secondaire • toute complication grave découlant du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nombre d'épisodes • la gravité <p>Premier épisode :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement taux standard, à condition qu'il ait été complètement excisé et aucune récurrence <p>Épisodes récurrents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • selon la gravité | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • date de l'excision ou du traitement • antécédents d'autres lésions cutanées • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la peau, à la limite de la malignité</p> <p>Comprend le carcinome basocellulaire, le nævus dysplasique et le lentigo malin.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • nombre et type des lésions • aucune invasion d'autres tissus • type et date du traitement • toute récurrence • facteurs de risque permanents • antécédents familiaux de cancer de la peau | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge • le nombre de lésions • le type • le traitement prescrit <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard (moins de 10 lésions) à refus (plus de 10 lésions) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type de lésions cutanées • statut du rétablissement • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médical • médicaments, posologie et traitements associés, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur toute complication • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Cancer : de la peau, malin</p> <p>Le plus grave de tous les cancers de la peau est le mélanome malin. Les personnes âgées et au teint pâle sont plus à risque.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type de cancer de la peau • pathologie, notamment la profondeur et l'épaisseur de la tumeur • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récurrence • facteurs de risque permanents | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type • la profondeur et l'épaisseur de la tumeur • le traitement • la date du traitement • le rapport de pathologie (requis pour les tarifications tentatives) <p>Dans un délai d'un an suivant le diagnostic ou le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • diagnostic précis • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur toute complication • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la prostate</p> <p>Le cancer de la prostate constitue le cancer le plus commun chez les hommes et l'une des causes principales de décès liées au cancer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • pathologie, notamment le stade et la cote selon la classification de Gleason • type de traitement • toute récurrence ou métastase • toute complication grave découlant du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type • la stadification • la cote selon la classification de Gleason <p>Néoplasie intra-épithéliale prostatique de bas grade :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>Proposants de moins de 50 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Proposants dans un délai d'un an suivant le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • test d'ASP <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type, stade et pathologie du cancer • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la thyroïde</p> <p>Le cancer de la thyroïde est fréquent chez les femmes et comporte un taux de succès de traitement élevé.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type de cancer de la thyroïde (papillaire, folliculaire etc.) • pathologie • type de traitement • âge de la proposante ou du proposant • réponse au traitement ou toute complication | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge au diagnostic • le type • la stadification <p>Dans un délai de cinq ans suivant le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'au refus <p>Cinq ans après le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard dans la plupart des cas | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapport de pathologie • type et stade du cancer • statut du rétablissement • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur toute complication • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|--|--|
| <p>Cancer : du poumon</p> <p>Le cancer du poumon est la principale cause de décès liée au cancer chez les hommes et les femmes. Il survient habituellement de 45 à 70 ans. Il existe un fort lien entre le cancer du poumon et le tabagisme.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type et stade du cancer • type de traitement • toute récurrence ou toute propagation à d'autres organes • toute complication grave découlant du traitement | <p>Propositions considérées si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tous les traitements sont terminés • la proposante ou le proposant ne fume pas • aucune récurrence <p>Propositions préliminaires suggérées.</p> <p>Les cancers de bas grade :</p> <ul style="list-style-type: none"> • avec ganglions négatifs seront considérés après un report de trois mois. • avec ganglions positifs sont considérés suivant un report de cinq ans. <p>Toute forme de métastase :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type, stade et pathologie du cancer • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • statut tabagique, passé et actuel • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : du sein</p> <p>Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus commun chez les femmes après le cancer de la peau et parmi les cancers, constitue la deuxième cause de décès chez les femmes après le cancer du poumon.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de cancer et stadification • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récurrence ou tout cancer secondaire • toute complication grave découlant du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge au diagnostic • la stadification de la maladie • le traitement prescrit <p>Propositions préliminaires suggérées.</p> <p>Carcinome in situ : (non invasif) bénéficie de taux moins élevés et peut être considéré après avoir complété le traitement.</p> <p>Tous les autres types et stadification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • reporter de deux ans ou plus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type et stade du cancer du sein • toute atteinte ganglionnaire • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : leucémie</p> <p>Les leucémies constituent des cancers malins des globules pouvant être chroniques ou aigus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de leucémie et stadification • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récurrence ou tout cancer secondaire • toute complication grave découlant du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type • la stadification <p>Une proposition préliminaire peut être justifiée afin de déterminer si nous pouvons accepter une proposition.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type et stade de la leucémie • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Cardiopathie congénitale</p> <p>Plusieurs malformations du cœur. Toutes varient de façon significative en gravité et traitement.</p> | <p>Les facteurs importants sont déterminés selon le nombre de problèmes congénitaux du cœur à considérer. Il est recommandé d'envoyer un courriel à l'adresse indnewbus@equitable.ca en prenant soin d'y inclure les détails de la maladie du cœur et tout traitement ou toute chirurgie s'y rattachant.</p> | | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type du trouble congénital précisions sur toute chirurgie, tout traitement ou médicament |
| <p>Chirurgie bariatrique</p> <p>La chirurgie bariatrique modifie l'estomac, l'intestin ou les deux afin de produire une perte de poids. La chirurgie bariatrique est quelques fois désignée sous le nom de « agrafage de l'estomac ».</p> | <ul style="list-style-type: none"> poids avant la chirurgie raison de la chirurgie (restrictive ou malabsorptive) toute autre affection (comme le diabète, l'hypertension artérielle ou la maladie du cœur) toute complication pendant ou après la chirurgie perte de poids avant la chirurgie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type de chirurgie la gravité le traitement le poids avant et après le traitement <p>Chirurgie restrictive jusqu'à trois ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 175 % <p>Chirurgie malabsorptive moins d'un an après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> report <p>Un an à cinq ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 % <p>Plus de cinq ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard à 150 % <p>L'une ou l'autre des chirurgies, plus de 10 ans après la chirurgie, poids stable, aucune complication :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type de chirurgie date de la chirurgie complications pendant ou après la chirurgie poids avant la chirurgie et poids actuel date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Colite ulcéreuse</p> <p>La colite ulcéreuse désigne une maladie chronique où le gros intestin devient enflammé et ulcéré.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel gravité des symptômes et de la maladie date de la dernière poussée active médicaments et posologie prescrits hospitalisations et visites en salle d'urgence stabilité du poids ou perte de poids complications médicales ou autres facteurs de risque pour la santé | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge actuel l'âge au diagnostic la gravité de la maladie <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 % jusqu'au refus <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux plus élevés pour les proposant plus jeunes <p>Dans un délai de six mois suivant la chirurgie, la poussée active ou le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> résultats et dates de la coloscopie coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin respect du point précédent date du dernier épisode ou de la dernière poussée active date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|--|---|
| <p>Consommation/abus d'alcool</p> <p>La consommation d'alcool considérée comme antécédents d'abus d'alcool ou un abus d'alcool actuel, un risque de dépendance et une forte consommation.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel quantité d'alcool déclarée tout diagnostic d'abus ou de dépendance période d'abstinence ou de consommation modérée toute rechute membre d'un groupe d'entraide relatif à la consommation d'alcool traitement avec médicament | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge le temps écoulé depuis la dernière utilisation les facteurs de comorbidité <p>Après cinq ans suivant le rétablissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard ou de surprime considérés <p>Rétablissement de moins de cinq ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> considération individuelle <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> la consommation d'alcool combinée à un diagnostic d'alcoolisme ou la dépendance à l'alcool fait l'objet d'un refus. | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif à la consommation d'alcool DMT DCA profil sanguin <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> précisions sur tout aspect favorable comme un emploi continu, la participation à un groupe d'entraide, l'abstinence complète, aucune rechute précisions sur tout traitement s'y rattachant dans un hôpital ou un centre de réadaptation résultats de tout examen de la fonction hépatique ou de maladie cardiaque coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et traitements associés prescrits date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Crise</p> | <ul style="list-style-type: none"> Voir Épilepsie/crises épileptiques | | |
| <p>Dépression</p> <p>La dépression désigne un sentiment de tristesse d'une intensité qui compromet le fonctionnement. Elle peut suivre une perte récente ou autre événement triste, mais n'est pas relation avec cet événement et dure au-delà d'une période appropriée.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge au diagnostic et âge actuel gravité toute hospitalisation ou traitement dans un autre établissement médical toute tentative de suicide ou idée suicidaire type de traitement, y compris le nombre et le type de médicaments toute perte de travail tout usage de drogue illicite | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge l'état actuel et la gravité de la dépression la cause de la dépression p. ex. circonstancielle le style de vie le réseau de soutien la perte de travail <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard (pour un bon contrôle des symptômes) jusqu'au refus <p>Facteurs favorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> aucun arrêt de travail ou hospitalisation au cours des cinq dernières années aucun usage de drogues à caractère social aucune tentative de suicide ou idée suicidaire bon suivi avec des professionnels médicaux réponse favorable au traitement | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif aux troubles nerveux DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type et cause de la dépression date du diagnostic fréquence des épisodes coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin impact sur les activités et le style de vie évaluation personnelle du contrôle actuel des symptômes avec ou sans médicaments date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Diabète</p> <p>Le diabète est un trouble métabolique causé par une production ou utilisation d'insuline inadéquate.</p> <p>Le diabète de type 1 (DID) requiert de l'insuline et est habituellement diagnostiqué à un jeune âge.</p> <p>Le diabète de type 2 (DNID) est habituellement diagnostiqué à un stade de la vie plus avancé et également appelé le diabète de l'adulte. Le traitement consiste en un médicament pris par voie orale ou il peut également être contrôlé par le régime alimentaire et l'exercice.</p> <p>Le diabète gestationnel se produit pendant la grossesse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de diabète • degré de contrôle • tout autre facteur de risque pour la santé p. ex. hypertension artérielle, taille et poids, statut tabagique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge actuel • l'âge au diagnostic • le type de diabète • le degré de contrôle • tout autre facteur de risque pour la santé p. ex. hypertension artérielle, taille et poids, statut tabagique <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • profil sanguin incluant le test d'hémoglobine (HgbA1C) • urine et test pour la microalbumine <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • précisions sur le système surveillant le taux de sucre • date et résultats du dernier suivi médical • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement <p>Le siège social commandera une DMT si nécessaire.</p> |
| <p>Drogues illicites</p> <p>Comprend tout usage actuel ou précédent de cocaïne, héroïne, ecstasy, amphétamines ou barbituriques et toute dépendance au Percocet, Oxycontin ou Oxycocet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type et quantité de l'usage actuel de drogues. • antécédents d'usage de drogues et la date de la dernière utilisation • emploi • antécédents familiaux d'usage de drogues • antécédents de dépression • antécédents de comportement criminel • âge • dossier de conduite automobile (DCA) | <p>Usage actuel de drogues autre que la consommation occasionnelle de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Usage passé d'ecstasy ou de cocaïne et usage occasionnel de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Consommation quotidienne de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Usage occasionnel de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération possible au taux standard pour personnes fumeuses <p>Usage de marijuana jusqu'à deux fois par semaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération possible au taux standard selon le cas <p>De cinq à sept ans après le dernier usage de cocaïne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération possible au taux standard selon le cas | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire relatif à l'usage de drogues • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • précisions sur l'usage actuel et passé de drogues et traitements incluant les dates • précisions sur les hospitalisations liées à l'usage de drogues ou les visites à l'urgence • précisions sur les accusations liées à la drogue • antécédents de dépression, de tentatives de suicide ou d'idées suicidaires • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|---|--|---|
| Emphysème | <ul style="list-style-type: none"> Voir Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) | | |
| Endobrachyœsophage L'endobrachyœsophage est caractérisé par un changement métaplasique des cellules muqueuses recouvrant la partie inférieure de l'œsophage en raison d'une blessure, souvent causé par le reflux acide chronique dans l'œsophage. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel test effectué (endoscopie, biopsie) état actuel | Tarification selon : <ul style="list-style-type: none"> la gravité le traitement | Exigences : <ul style="list-style-type: none"> DMT Renseignements utiles : <ul style="list-style-type: none"> coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement. date et résultats du dernier suivi médical |
| Épilepsie/crise épileptique L'épilepsie est un terme englobant de nombreux types de troubles de crises : les crises épileptiques partielles (focales), l'épilepsie généralisée et les crises généralisées. | <ul style="list-style-type: none"> cause et type des crises degré de contrôle avec ou sans médicament âge actuel âge au diagnostic fréquence des crises date de la dernière crise respect des médicaments prescrits, de la posologie et des traitements s'y rattachant | Tarification selon : <ul style="list-style-type: none"> l'âge actuel l'âge au diagnostic le type et la fréquence des crises (ou crises épileptiques) Échelle : <ul style="list-style-type: none"> taux standard jusqu'au refus Aucune crise pendant sept ans : <ul style="list-style-type: none"> considération au taux standard | Exigences : <ul style="list-style-type: none"> possiblement une DMT Renseignements utiles : <ul style="list-style-type: none"> diagnostic précis p. ex. une crise d'absence (petit mal), épilepsie atonique, crise myoclonique, crise de grand mal, crise partielle simple, crise partielle complexe (psychomoteur) coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin arrêt de travail en raison de cette affection impact sur les activités et le style de vie date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Fibrillation auriculaire/ flutter auriculaire</p> <p>La fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire sont caractérisés par des décharges électriques très rapides qui font que l'oreillette se contracte très rapidement, dont certains des signaux électriques atteignant les ventricules et faisant en sorte qu'elles se contractent plus rapidement et moins efficacement que d'habitude.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel date du diagnostic de la fibrillation auriculaire ou du flutter auriculaire, l'âge du client au moment du début de cette affection nombre de fois que cela se produit type des examens ou de traitement toute affection ou maladie du cœur coexistante chronique ou paroxysmique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge la gravité la fréquence <p>Affection récemment diagnostiquée :</p> <ul style="list-style-type: none"> report ou refus <p>Bon contrôle – moins de quatre crises par année, aucune affection sous-jacente, 60 ans et moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard à 150 % <p>Bon contrôle – moins de quatre crises par année, aucune affection sous-jacente, plus de 60 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 175 % <p>Affection chronique qui requiert un traitement, 60 ans et moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 200 % <p>Affection chronique qui requiert un traitement, plus de 60 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 200 à 250 % | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> âge au diagnostic nature des symptômes fréquence et gravité des symptômes tests effectués antécédents familiaux de maladie coronarienne, d'affection valvulaire ou d'accident vasculaire cérébral médicaments, posologie et traitements associés prescrits respect du point précédent modifications du style de vie ou des activités de la vie quotidienne date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Hépatite</p> <p>L'hépatite se caractérise par une inflammation du foie se présentant à la fois sous forme aiguë ou chronique. L'hépatite aiguë découle d'une infection virale, comprenant l'hépatite A, B, C et E, ou du dommage causé par la drogue ou les toxines telles que l'alcool.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type d'hépatite et date du diagnostic état actuel, y compris toute infection récente ou prolongée tout dommage au foie ou autre organe traitement actuel et historique du traitement ou biopsie du foie antécédents de tout usage de drogues intraveineuses | <p>Antécédents d'hépatite A :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>État de porteur d'hépatite B sans aucune infection et profil sanguin normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux de 175 %. Aucune considération des bébés et des enfants. <p>Infection actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> report jusqu'au refus <p>Hépatite C :</p> <ul style="list-style-type: none"> considération si asymptomatique et état de santé actuel excellent <p>Preuve de dommage au foie :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus probable | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> profil sanguin comprenant un dépistage actuel de l'hépatite, à l'exception d'antécédents d'hépatite A possiblement une DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type d'hépatite et si état de porteur seulement comment elle a été contractée tout test du foie, y compris une échographie, un tomodynamogramme, une biopsie du foie avec les dates et les résultats date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|--|---|
| <p>Hypertension artérielle</p> <p>L'hypertension artérielle se caractérise par une élévation durable de la tension artérielle au-dessus du niveau considéré acceptable selon l'âge et le sexe de la personne</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel et âge à l'apparition • type de traitement • tout autre facteur de risque cardiaque • lectures de la tension artérielle actuelles • antécédents familiaux de maladie cardiaque • taille et poids • statut tabagique | <p>En général, taux standard pour une lecture de la tension artérielle dont les résultats sont normaux et sans facteur de comorbidité.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • respect du point précédent • date et résultats de la dernière consultation pour le trouble cardiaque, le cas échéant, ou du dernier suivi médical |
| <p>Infarctus du myocarde/ crise cardiaque/ thrombose coronaire</p> <p>Dommage permanent d'une partie du muscle du cœur en raison d'un apport en oxygène et d'un débit coronarien inadéquats.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité de la crise ou de la maladie et combien de vaisseaux sont impliqués • type de traitement • médicaments et posologie prescrits • statut tabagique • étendue des effets résiduels ou dommage permanent • tout facteur de risque supplémentaire pour la santé | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge à l'apparition • la cause • la gravité <p>Proposition préliminaire suggérée.</p> <p>Dans un délai de six mois suivant l'épisode ou la crise, y compris la date de traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune considération <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • statut tabagique • facteurs de comorbidité • épisodes récents • proposants plus jeunes (de 40 ans et moins, refus probable) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT et antécédents cardiaques complets <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dates et nombre de crises ainsi que le nombre de vaisseaux sanguins impliqués • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • date et résultats de la dernière consultation pour le trouble cardiaque |
| <p>Maladie coronarienne</p> <p>La maladie coronarienne est une affection caractérisée par un blocage partiel ou complet de la circulation sanguine au muscle du cœur.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité, nombre de vaisseaux touchés • tout problème résiduel, état actuel • traitement, chirurgie, médicaments • statut tabagique • facteurs de comorbidité p. ex. hypertension artérielle, diabète | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge (taux plus élevés pour les proposants plus jeunes) • la gravité de la maladie <p>Dans un délai de six mois suivant le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune considération <p>Moins de 40 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus probable <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 200 % jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats de la dernière consultation liée à la maladie cardiaque |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|---|--|
| <p>Maladie d'Alzheimer</p> <p>La démence de type Alzheimer est une maladie touchant les personnes âgées et la prévalence augmente avec l'âge. Cette maladie comporte une grave perte de la fonction intellectuelle. La démence est grave et graduelle. Les premiers symptômes consistent en une perte de mémoire, particulièrement pour les événements récents, et une diminution de l'efficacité au travail et à la maison.</p> | | <p>Cas présumés ou actuels :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus | |
| <p>Maladie de Crohn</p> <p>Une maladie chronique inflammatoire qui peut toucher toute partie de la voie gastro-intestinale. Elle peut comprendre des problèmes d'ulcération ou de malabsorption.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge au diagnostic et âge actuel gravité du dernier épisode toute hospitalisation ou chirurgie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge (taux plus élevés pour les proposant plus jeunes) la gravité de la maladie <p>Diagnostic reçu il y a moins d'un an :</p> <ul style="list-style-type: none"> report <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard (pour une rémission de plus de cinq ans), jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> stabilité du poids coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin précisions sur les chirurgies et résultats s'y rattachant date et résultats de la dernière coloscopie et du dernier suivi médical |
| <p>Polyarthrite rhumatoïde</p> <p>La polyarthrite rhumatoïde est une arthrite inflammatoire où les articulations, comprenant habituellement celles des mains et des pieds, sont enflammées, causant de l'enflure, de la douleur et souvent la destruction des articulations.</p> | <ul style="list-style-type: none"> gravité actuelle, durée et articulations touchées traitement actuel, médicaments ou toute chirurgie toute hospitalisation ou arrêt de travail âge à l'apparition toute complication actuelle toute affection coexistante degré de fonctionnement, notamment les activités de la vie quotidienne, la mobilité tâches liées à l'emploi actuel | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> la gravité le traitement <p>Polyarthrite rhumatoïde légère à modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard à 175 % <p>Polyarthrite rhumatoïde grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 % et plus <p>Polyarthrite rhumatoïde progressant rapidement ou fortement incapacitante :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> date du diagnostic nature des symptômes depuis le diagnostic, les symptômes sont-ils devenus plus ou moins graves, ou demeurés les mêmes? dates, raison et résultats de toute hospitalisation liée ou de visite à l'urgence dates de tout arrêt de travail en raison de cette affection médicaments, posologie et traitements associés prescrits respect du point précédent coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et les numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|--|---|
| Pontage coronarien | <ul style="list-style-type: none"> voir Maladie coronarienne | Reporter jusqu'à six mois après le traitement initial. | |
| Proposants âgés Les proposants âgés de 65 ans et plus pourraient nécessiter une tarification supplémentaire spécifique à leur âge. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel statut d'emploi statut tabagique en ce qui concerne tout facteur de risque pour la santé soutien familial antécédents de chute ou d'accidents usage et type des médicaments régularité des examens de santé | Tarification selon : <ul style="list-style-type: none"> la santé et le style de vie de la proposante ou du proposant tout facteur de risque néfaste pour la santé | Exigences : <ul style="list-style-type: none"> exigences relatives à l'âge et au montant selon le régime et la somme assurée possiblement une DMT Renseignements utiles : <ul style="list-style-type: none"> fréquence de l'activité fréquence des examens de santé date et résultats du dernier examen de santé |

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|---|--|---|--|
| <p>Aviation commerciale</p> <p>Ces pilotes comprennent ceux qui participent ou qui travaillent pour les transporteurs aériens de passagers ou de marchandises à l'intérieur de l'Amérique du Nord, à l'épandage agricole, les pilotes de brousse, les vols nolisés, la photographie, les instructeurs de vol, etc.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de vol et heures de vol cumulées nombre d'heures totales en tant que pilote incluant les accréditations spéciales type d'aéronef et destinations heures de vol prévues au cours des 12 à 24 prochains mois | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type de vol spécialisé l'expérience en tant que pilote, y compris les heures de vol par année <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard jusqu'à 10 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> tout facteur de risque pour la santé <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> une clause d'exclusion spéciale n'est habituellement pas offerte | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif à l'aviation <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de vol spécialisé expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année tout accident survenu |
| <p>Aviation privée</p> <p>Il s'agit de pilotes non professionnels qui effectuent des vols d'affaires ou pour le plaisir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de vol et heures de vol cumulées nombre d'heures totales en tant que pilote incluant les accréditations spéciales type d'aéronef et destinations heures de vol prévues au cours des 12 à 24 prochains mois | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge l'expérience de vol (nombre d'heures) <p>Moins de 100 heures de vol cumulées ou moins de 26 ans ou étudiant-pilotes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,50 \$ x cinq ans (dans la plupart des cas) <p>Les proposant de plus de 26 ans, comptant plus de 100 heures de vol cumulées ou prévoyant moins de 200 heures de vol au cours des 12 prochains mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> considération au taux standard <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> une clause d'exclusion spéciale peut être offerte | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif à l'aviation <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de vol spécialisé expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année tout accident survenu |
| <p>Aviation sportive</p> <p>Comprend le vol récréatif ou sportif, comme le vol deltaplane, le vol en avion ultra-léger, le parachutisme etc.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de vol destinations de vol statut amateur ou professionnel antécédents médicaux et de style de vie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'activité la fréquence la destination <p>Il est suggéré d'envoyer une demande de renseignements par courriel.</p> <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> une clause d'exclusion spéciale peut être offerte la tarification peut varier selon la participation | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif à l'aviation ou Questionnaire relatif au parachutisme et au saut en chute libre, ou tout autre questionnaire relatif au passe-temps approprié <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de l'aviation sportive expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année membre d'un aéroclub spécialisé tout accident survenu type d'aéronef, y compris de fabrication amateur |

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|--|--|
| Conduite automobile | <ul style="list-style-type: none"> nombre et type des infractions gravité de l'infraction âge actuel âge au moment de l'infraction infractions pour conduite avec facultés affaiblies toute suspension de permis | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge actuel la gravité le nombre d'infractions <p>Dans un délai de six mois suivant une infraction pour conduite avec facultés affaiblies ou achèvement de suspension :</p> <ul style="list-style-type: none"> aucune considération <p>Plus de deux infractions pour conduite avec facultés affaiblies :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus pour les proposants plus jeunes tarification plus élevée | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DCA en plus des questionnaires applicables (p. ex.. usage de drogues, consommation d'alcool, etc.) <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type et validité du permis de conduire dates et précisions sur les infractions dates et précisions de toute infraction de conduite avec facultés affaiblies pénalités, y compris les amendes et les suspensions toute contravention en souffrance |
| Course de véhicule automobile Comprend la course ARCA, la course d'accélération, la course de vitesse, la voiture de série, etc. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de véhicule type de carburant fréquence de la course vitesse type de parcours antécédents médicaux et de style de vie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type de véhicule le type de carburant la vitesse <p>Les voitures de série, la course de carambolage et l'autocross et le motocross :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>Échelle pour tous les autres types de course :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 2,50 \$ à 10 \$ de plus par tranche de mille dollars | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif aux sports motorisés <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type de véhicule type de carburant utilisé fréquence de la course statut amateur ou professionnel vitesse moyenne et maximale de course |
| Escalade Comprend l'escalade de rocher et de glace. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de terrain endroit et hauteur fréquence d'escalade expérience antécédents médicaux et de style de vie | <p>Escalade de rocher à l'intérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>Escalade de rocher de moins de 4 000 mètres (13 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,50 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Escalade de glace de moins de 4 000 mètres (13 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,50 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Escalade extrême de plus de 7 000 mètres (23 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> une clause d'exclusion spéciale peut être offerte la tarification peut varier selon la participation | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> Questionnaire relatif à l'escalade <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> fréquence, hauteur moyenne et endroit d'escalade grimpeuse ou grimpeur en solitaire ,avec un groupe ou encore une instructrice ou un instructeur endroit d'escalade |

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES DE TARIFICATION |
|--|--|--|--|
| <p>Immigration</p> <p>Les proposants qui ne détiennent pas le statut de résident permanent ne sont généralement pas acceptés; toutefois, il peut y avoir des exceptions pour ceux qui détiennent un permis de travail ou ceux faisant partie du programme des aides familiaux résidants parrainé par le gouvernement du Canada.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • pays d'origine • date de l'arrivée au Canada • type de statut de résident • emploi actuel | | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • exigences relatives à l'âge ou au montant d'assurance <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • copie des documents d'immigration • date de l'arrivée au Canada • statut d'immigration actuel • intention de faire la demande de statut de résident permanent |
| <p>Plongée avec scaphandre autonome</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • expérience et certification • profondeur des plongées • fréquence et endroits • participation à des activités de plongée supplémentaires, comme l'exploration de caves, les épaves, etc. • antécédents médicaux et du style de vie • antécédents de plongée spécialisée • antécédents d'abus ou d'usage de drogues ou d'alcool | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la profondeur • l'endroit des plongées • le type de plongée <p>Plongée à des fins récréatives dans un endroit de villégiature, en eaux libres ou dans des lacs d'une profondeur de moins de 30 mètres (100 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>Plongée souterraine, plongée sur épave, plongée de recherche et de sauvetage, profondeurs de plus de 30 mètres (100 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,50 \$ de plus par tranche de mille dollars et plus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une clause d'exclusion spéciale peut être offerte | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • niveau de certification de plongée • statut amateur ou professionnel • profondeur moyenne de plongée • fréquence et endroit de plongée |
| <p>Voyage missionnaire</p> <p>Les personnes qui voyagent hors du Canada aux fins d'un travail missionnaire, du maintien de la paix, de diplomatie gouvernementale, journalistique ou d'aide à l'étranger.</p> | | non assurable | |

LIGNES DIRECTRICES SUR LA TARIFICATION FINANCIÈRE

NOTA : RE est l'acronyme utilisé pour « rapport d'enquête ». La lettre de présentation doit être aussi complète que possible pour aider la tarificatrice ou le tarificateur à bien comprendre le besoin d'assurance et la couverture demandée. Il est à noter que ce ne sont que des lignes directrices. L'Assurance vie Équitable se réserve le droit de modifier les présentes lignes directrices en tout temps et demander toute preuve d'assurabilité supplémentaire.

| NOTES | OBJET | EXIGENCES | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|
| Remplacement de revenu | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance RE requis pour les sommes de plus de 5 millions \$ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Âge</th> <th>Facteur du revenu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 à 29 ans</td> <td>30 fois</td> </tr> <tr> <td>30 à 39 ans</td> <td>25 fois</td> </tr> <tr> <td>40 à 49 ans</td> <td>20 fois</td> </tr> <tr> <td>50 à 59 ans</td> <td>15 fois</td> </tr> <tr> <td>60 à 69 ans</td> <td>6 à 8 fois</td> </tr> </tbody> </table> <p>Suppose une augmentation du salaire annuel de 5 %</p> | Âge | Facteur du revenu | 20 à 29 ans | 30 fois | 30 à 39 ans | 25 fois | 40 à 49 ans | 20 fois | 50 à 59 ans | 15 fois | 60 à 69 ans | 6 à 8 fois |
| Âge | Facteur du revenu | | | | | | | | | | | | | |
| 20 à 29 ans | 30 fois | | | | | | | | | | | | | |
| 30 à 39 ans | 25 fois | | | | | | | | | | | | | |
| 40 à 49 ans | 20 fois | | | | | | | | | | | | | |
| 50 à 59 ans | 15 fois | | | | | | | | | | | | | |
| 60 à 69 ans | 6 à 8 fois | | | | | | | | | | | | | |
| Préservation du patrimoine | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance Lettre de présentation requise pour les sommes de plus de 3 millions \$ RE requis pour les sommes de plus de 5 millions \$ | <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à deux fois la valeur nette patrimoniale. | | | | | | | | | | | | |
| Enfants | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance Lettre de présentation requise pour les sommes de plus de 250 000 \$ | <ul style="list-style-type: none"> Les sommes assurées devraient être proportionnelles, dans une mesure raisonnable, au revenu familial et à la valeur nette patrimoniale Les frères et sœurs devraient être assurés pour des sommes similaires. Règle générale, les parents devraient posséder une assurance deux fois plus importante que celle de leurs enfants. Certaines exceptions pourront être considérées. | | | | | | | | | | | | |
| Étudiants de niveaux collégial et universitaire | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance | <ul style="list-style-type: none"> Les sommes assurées suivantes seront considérées : <ul style="list-style-type: none"> jusqu'à 500 000 \$ pour les étudiants postsecondaires jusqu'à 1 000 000 \$ pour les étudiants en médecine et médecine dentaire | | | | | | | | | | | | |
| Couverture des frais associés au décès | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance | <ul style="list-style-type: none"> Assurance qui couvre les factures médicales par exemple, ou les frais associés au décès, aux funérailles ou à un enterrement La somme assurée maximale est de 250 000 \$. | | | | | | | | | | | | |
| Transfert du patrimoine entre les générations | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance Lettre de présentation Pourrait nécessiter la confirmation de l'actif familial par un tiers | <ul style="list-style-type: none"> Considération individuelle | | | | | | | | | | | | |
| Dons de bienfaisance | <ul style="list-style-type: none"> Proposition d'assurance Lettre de présentation | <ul style="list-style-type: none"> Considération individuelle La lettre de présentation devrait également fournir des renseignements de la relation avec l'œuvre de bienfaisance La somme assurée minimale est généralement de 25 % de l'avoir net, à condition que les besoins d'assurance traditionnels aient été satisfaits | | | | | | | | | | | | |
| L'un ou l'autre des cas indiqués ci-dessus - éléments d'actif étrangers | <ul style="list-style-type: none"> Exigences pertinentes énoncées ci-dessus | <ul style="list-style-type: none"> Considération individuelle La lettre de présentation devrait aussi inclure la source du paiement de la prime et la somme des avoirs canadiens et étrangers Considération possible jusqu'à concurrence de 50 % des éléments d'actif étrangers, si vérifiés par un établissement financier international | | | | | | | | | | | | |

DÉFINITIONS RELATIVES AU STATUT TABAGIQUE

| | |
|---|--|
| Produits Équation Génération IV, ÉquiVU, Équimax et AMG ÉquiVivre | Pour être considérée comme personne non fumeuse, la personne assurée ne doit pas avoir fait usage de produits comme la cigarette, la pipe ou le tabac à chiquer, tout produit d'abandon du tabac, de remplacement du tabac ou de la marijuana au cours des 12 derniers mois. Un maximum d'un cigare ou d'un cigarillo par mois est autorisé, sous réserve d'un taux de cotinine négatif. |
| Régimes et avenants d'assurance vie temporaire | <p>Catégorie 1 - Privilégiée plus pour personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucun usage de la cigarette, du cigare, du cigarillo, de la pipe, du tabac à chiquer, de produits d'abandon du tabac, de produits de remplacement au tabac ou de la marijuana au cours des derniers 24 mois. <p>Catégorie 2 - Privilégiée pour personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucun usage de la cigarette, du cigare, du cigarillo, de la pipe, du tabac à chiquer, de produits d'abandon du tabac, de produits de remplacement au tabac ou de la marijuana au cours des derniers 12 mois. <p>Catégorie 3 - Personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> Aucun usage de la cigarette, de la pipe, du tabac à chiquer, de produits d'abandon du tabac, de produits de remplacement au tabac ou de la marijuana au cours des derniers 12 mois. Un maximum d'un cigare ou d'un cigarillo par mois est autorisé, sous réserve d'un taux de cotinine négatif. <p>Catégorie 4 - Privilégiée pour personnes fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en bonne santé et fume la cigarette ou fait usage des produits à base de nicotine. L'évaluation s'effectue selon des critères relatifs à la santé, similaires à ceux de la catégorie 2, privilégiée pour personnes non fumeuses. <p>Catégorie 5 - Personnes fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en santé et fume la cigarette ou fait usage des produits à base de nicotine. |

PROGRAMME INCITATIF D'ABANDON DU TABAC



Le programme incitatif d'abandon du tabac de l'Équitable s'applique aux produits suivants :

- Équation Génération IV
- Équimax
- Régimes et avenants d'assurance vie temporaire

Ce programme n'est pas offert avec les produits suivants :

- ÉquiVivre
- Avenants d'assurance maladies graves ÉquiVivre
- Assurance vie universelle ÉquiVU à paiements limités

Comment ça fonctionne

Si votre cliente ou votre client arrête de fumer pendant 12 mois consécutifs pendant les deux premières années contractuelles, l'Assurance vie Équitable remboursera la différence entre le montant payé en tant que personne fumeuse et ce qu'il aurait payé en tant que personne non fumeuse, pour un maximum équivalant à une prime mensuelle. L'admissibilité est sous réserve de certaines conditions, y compris un taux de cotinine négatif et une preuve d'assurabilité continue.

Les clients munis d'un contrat d'assurance vie temporaire peuvent être admissibles pour passer de la catégorie 4 privilégiée pour personnes fumeuses ou de la catégorie 5 pour personnes fumeuses à la catégorie 3 pour personnes non fumeuses.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régional(e) en marketing de l'assurance vie individuelle ou encore votre représentante ou votre représentant de l'Équitable. Vous pouvez également présenter vos demandes de renseignements concernant la tarification à l'adresse indnewbus@equitable.ca.

Tout à fait pour moi.^{MC}

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui leur importe le plus. Nous travaillons de concert avec vous afin de vous offrir des solutions de grande qualité et de vous aider à trouver les bonnes solutions pour satisfaire les besoins de votre clientèle.

Mais nous sommes plus qu'une compagnie typique de services financiers. Nous possédons la connaissance, l'expérience et la compétence afin de trouver des solutions qui vous conviennent ainsi qu'à votre clientèle. Nous sommes sympathiques, attentionnés et intéressés à vous aider. Nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat et non d'actionnaires. Alors nous pouvons nous concentrer sur vos intérêts et vous fournir un service personnalisé, la sécurité et le mieux-être.

Bien que les renseignements de ce document se veuillent le plus à jour possible, les modalités de la police prévalent dans tous les cas.



Assurance vie
Équitable du Canada™

One Westmount Road North
Waterloo (Ontario) N2J 4C7

Veillez visiter notre site Web à l'adresse www.equitable.ca/fr

^{MC} et ^{MD} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.