



ASSURANCE INVALIDITÉ

## Assurance individuelle – manuel de tarification pour les conseillers

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS

Assurance  
 **Manuvie**



# Table des matières

<b>Objet du présent manuel</b>	<b>5</b>	Déviation de la colonne vertébrale	13
<b>Structure de ce document</b>	<b>6</b>	Diabète	13
<b>Légende</b>	<b>6</b>	Diverticulite; Diverticulose	13
<b>Les antécédents familiaux sont un facteur important en matière de santé</b>	<b>7</b>	Douleurs thoraciques : Origine incertaine	13
<b>Troubles médicaux</b>		Emphysème	13
Abus d'alcool ou de drogues	8	Endométriose	14
Accident ischémique transitoire (AIT); Accident vasculaire cérébral (AVC)	8	Entorses au dos, au cou ou cervicales	14
Acromégalie	8	Épilepsie	14
Affections cutanées : Dermatite; Eczéma; Psoriasis	8	Étourdissements	14
Amputations	8	Fibromyalgie	14
Anémie	9	Fractures	15
Angine de poitrine	9	Fractures : Dos	15
Ankylose	9	Gastrite	15
Anomalies du cœur : Angine de poitrine	9	Glaucome	15
Anomalies du cœur : Coronaropathie	9	Glomérulonéphrite	15
Anomalies du cœur : Hypertrophie	9	Goitre	15
Anomalies du cœur : Prolapsus de la valve mitrale	9	Goutte	15
Anomalies du cœur : Souffle	9	Grossesse	15
Anomalies du cœur : Tachycardie	9	Hémochromatose	15
Anorexie mentale	9	Hépatite	16
Apnée du sommeil	10	Hernie discale	16
Artériosclérose	10	Hernie : Inguinale; Hiatale; Ombilicale	16
Arthrite : Non rhumatoïde	10	Herpès zoster	16
Arthrite : Rhumatoïde	10	Hypertension artérielle (HTA)	16
Arthrose	10	Hyperthyroïdie ou Hypothyroïdie	16
Asthme	11	Hypoglycémie	16
Avortement spontané (fausse couche)	11	Hystérectomie	16
Boulimie mentale	11	Infarctus du myocarde	16
Bronchite	11	Insomnie	17
Bursite : Synovite; Ténosynovite	11	Insuffisance rénale	17
Calcul néphrétique	11	Kyste ovarien	17
Calculs biliaires	12	Lupus érythémateux disséminé (LED)	17
Cancer : Autre que le cancer de la peau	12	Lupus : Lupus discoïde; Lupus érythémateux disséminé (LED)	17
Carcinome basocellulaire	12	Luxations	17
Cataracte	12	Maladie céliaque	17
Cécité	12	Maladie d'Addison	17
Cholestérol : Taux élevé	12	Maladie de Crohn	17
Chorée de Huntington	12	Maladie de Graves	17
Cirrhose du foie	12	Maladie de Hodgkin	17
Colite	12	Maladie de Ménière	18
Commotion cérébrale	12	Maladie de Parkinson	18
Coronaropathie	12	Maladie de Raynaud	18
Crise cardiaque	12	Maladie ou syndrome de Cushing	18
Cystite	12	Maladie polykystique des seins	18
Décollement de la rétine; Décollement rétinien	13	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	18
Dépression	13	Marijuana (consommation de)	18
Dépression majeure	13	Mastôidite	18
		Maux de tête : Migraines	18
		Méningite	18

Migraines	19	Troubles des poumons : Emphysème; Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	26
Myosite	19	Troubles des poumons : Pleurésie	26
Nævus dysplasique	19	Troubles des poumons : Pneumonie	26
Narcolepsie	19	Troubles des poumons : Pneumonite	26
Néphrectomie	19	Troubles des poumons : Pneumothorax	27
Néphrite	19	Troubles des poumons : Tuberculose	27
Obésité	19	Troubles des reins : Calcul néphrétique	27
Pancréatite	19	Troubles des reins : Glomérulonéphrite	27
Phlébite; Thrombose veineuse; Thrombophlébite	20	Troubles des reins : Greffe de rein	27
Pleurésie	20	Troubles des reins : Insuffisance rénale	28
Pneumonie	20	Troubles des reins : Maladie polykystique des reins	28
Pneumothorax	20	Troubles des reins : Néphrectomie	28
Poids insuffisant	20	Troubles des tissus conjonctifs : Lupus discoïde	28
Prolapsus de la valve mitrale (PVM)	20	Troubles des tissus conjonctifs : Lupus érythémateux disséminé (LED)	28
Psoriasis	20	Troubles des yeux : Cataracte	28
Reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO)	20	Troubles des yeux : Cécité; Déficience visuelle	29
Sclérose en plaques	20	Troubles des yeux : Décollement de la rétine	29
Sclérose latérale amyotrophique (SLA)	20	Troubles des yeux : Glaucome	29
Scoliose	20	Troubles des yeux : Iritis	29
Sida – Syndrome d’immunodéficience acquise	20	Troubles du dos : Déviation de la colonne vertébrale	29
Splénectomie	20	Troubles du dos : Hernie discale, disque hernié ou « disque rompu »	30
Surdité	20	Troubles du dos : vertèbres fracturées	30
Syncope	21	Tuberculose	30
Syndrome CREST	21	Tumeurs	30
Syndrome de fatigue chronique	21	Tumeurs de la peau : Bénignes; Sans mélanome; Avec mélanome	30
Syndrome du canal carpien	21	Ulcère	30
Tension artérielle élevée	21	Usage de drogues : Drogues non prescrites, narcotiques	30
Thalassémie	21	Usage de drogues	30
Thrombose veineuse profonde	21	Varices : Jambes	31
Toxicomanie	21	Vertige	31
Triglycérides : Taux élevé	21	Zona	31
Trouble déficitaire de l’attention (TDA)	22		
Troubles affectifs et d’adaptation; Anxiété	22	<b>Risques non médicaux</b>	
Troubles de l’alimentation : Anorexie mentale, Boulimie mentale	22	Aviation – Privée	32
Troubles de l’estomac : Gastrite	23	Aviation – Sport	32
Troubles de l’estomac : Indigestion	23	Conduite	32
Troubles de l’estomac : Ulcère	23	Course automobile	32
Troubles de la prostate : Hypertrophie	23	Escalade – Falaise	33
Troubles de la prostate : Prostatite	23	Escalade – glace et/ou neige	33
Troubles de la thyroïde : Hyperthyroïdie	23	Escalade – Montagne	33
Troubles de la thyroïde : Hypothyroïdie	24	Escalade – Rocher	33
Troubles de la thyroïde : Maladie de Graves	24	Escalade – Trekking	33
Troubles de la thyroïde : Nodules thyroïdiens	24	Plongée sous-marine	34
Troubles des genoux	24	Voyages à l’étranger	34
Troubles des intestins : Colite infectieuse	24		
Troubles des intestins : Colite ulcéreuse	25	<b>Statut de fumeur – définition</b>	<b>35</b>
Troubles des intestins : Côlon irritable; Colite spastique	25	<b>Taille et poids – adultes</b>	<b>35</b>
Troubles des oreilles : Maladie de Ménière	25		
Troubles des oreilles : Mastoïdite	25		
Troubles des oreilles : Surdit�; Perte de l’ou�ie	26		

## Objet du présent manuel

Le présent manuel est un outil important qui peut vous être très utile, particulièrement lorsque vous examinez les antécédents médicaux de votre client. Vous trouverez ci-après un survol des troubles médicaux et des maladies que rencontrent le plus souvent les tarificateurs d'assurance invalidité.

Ce manuel renferme de brèves descriptions de troubles courants, ainsi que les facteurs de risque qui influent sur l'évaluation finale d'un tarificateur et les taux probables qui seront appliqués. Grâce à ce manuel, vous saurez de quels renseignements le tarificateur aura besoin pour évaluer un trouble médical précis. En fournissant ces renseignements dès le départ, vous permettrez au tarificateur de préparer son évaluation préliminaire plus rapidement et aiderez Manuvie à vous présenter la meilleure offre possible, dans les plus brefs délais.

Il importe de comprendre qu'on fournit dans ce document seulement une estimation préliminaire du taux qui sera appliqué, car il est difficile d'évaluer le risque sans connaître toutes les particularités d'un cas donné. Autrement dit, l'offre finale du tarificateur peut différer, compte tenu de l'ensemble des faits. Ce document vous aidera aussi à préparer vos clients aux surprimes médicales qui pourraient s'appliquer, ce qui devrait améliorer vos résultats au moment de la délivrance du contrat.

### **Bien comprendre la tarification de l'assurance invalidité**

L'évaluation effectuée en assurance invalidité est beaucoup plus approfondie qu'en assurance vie. Nombreux sont les maux qui ne mettent pas la vie en danger, mais qui augmentent la probabilité de devenir invalide. Dans bien des cas, il est possible d'accepter certains risques médicaux sous réserve de modifications au contrat : surprime, exclusions contractuelles et réduction de la durée des prestations, par exemple.

Le tarificateur d'assurance invalidité évalue le risque sous un angle particulier, en se posant la question suivante : une affection peut-elle entraîner un risque accru d'invalidité ou de restrictions?

# Structure de ce document

Le présent manuel fournit une liste complète, mais non exhaustive, des troubles médicaux. Les décisions suggérées n'ont qu'une valeur indicative, et les offres réelles peuvent différer de ces décisions. Les offres dépendront de chaque situation et d'autres facteurs pourront aussi avoir un effet sur notre décision.

Ce document se divise en deux grandes sections : troubles médicaux et risques non médicaux.

L'information est organisée comme suit :

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
Indique les affections et fournit une brève description de chacune. Les affections, et les sous-types s'il y a lieu, sont en ordre alphabétique.	Indique les critères que le tarificateur utilise pour déterminer la catégorie de risque.	Indique les documents et examens médicaux que le tarificateur va probablement demander en plus des exigences relatives à l'âge et au montant d'assurance. Énumère les précisions à inclure pour permettre au tarificateur d'accorder le plus de crédits possible et l'aider à prendre la meilleure décision dès le départ. Rappelle qu'une DMT est nécessaire pour demander les bons renseignements au médecin, ce qui simplifie le processus de tarification, tout en réduisant considérablement les demandes de rapports ultérieures.	Indique la catégorie, le taux ou la surprime applicables, selon les facteurs et renseignements présentés. Pour la plupart des affections, on effectue une évaluation préliminaire basée sur des critères précis.

## Légende

Décision probable du tarificateur	Définition
<b>Refus</b>	Non assurable
<b>Exclusion</b>	Ajout au contrat d'une disposition excluant une activité, une maladie ou une partie du corps précises
<b>Considération individuelle</b>	Assurabilité limitée; soumettre une proposition à l'essai
<b>Décision différée</b>	Décision différée jusqu'à ce que l'affection soit complètement guérie ou qu'une certaine période se soit écoulée
<b>Surprime</b>	Majoration d'un pourcentage des taux de prime. La clause <i>Améliorations automatiques de la couverture</i> et la garantie <i>Augmentation supplémentaire</i> ne seront pas offertes
<b>Tarifification en fonction de la cause</b>	Tarifification ou modification en fonction de la cause sous-jacente, s'il y a lieu
<b>Réduction des prestations</b>	Toute combinaison suivante : modifications au contrat, réduction de la prestation mensuelle, restriction ou augmentation de la période d'attente, élimination des garanties complémentaires et de certaines dispositions contractuelles
<b>Standard</b>	Offre médicale standard sans restrictions

# Les antécédents familiaux sont un facteur important en matière de santé

Les antécédents familiaux (parents, frères et sœurs) sont un facteur de risque important d'évaluation pour les produits d'assurance. Certains facteurs d'évaluation du risque tiennent compte du diagnostic de la maladie et de l'âge à l'apparition de la maladie; toutefois, les avancées dans ce domaine progressent rapidement et notre approche est en constante évolution.

L'Organisation mondiale de la Santé décrit un facteur de risque comme : tout attribut, caractéristique ou exposition d'un sujet qui augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d'un traumatisme. Les facteurs de risque les plus importants sont par exemple, le déficit pondéral, les rapports sexuels non protégés, l'hypertension artérielle, la consommation de tabac ou d'alcool, l'eau non potable, l'insuffisance de l'hygiène ou de l'assainissement.

Les facteurs de risque d'une maladie peuvent être réduits en mangeant sainement, en faisant assez d'exercice et en ne fumant pas. Les membres d'une famille partagent souvent le même environnement, un mode de vie et des habitudes de vie similaires, ce qui signifie que les antécédents familiaux constituent un facteur de risque pour une gamme variée de maladies, notamment : maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, diabète et cancers. La reconnaissance des antécédents familiaux peut aider à réduire les facteurs de risque de subir des problèmes de santé et favoriser l'adoption de choix plus santé.

Principales caractéristiques des antécédents familiaux pouvant constituer un facteur de risque accru :

- une maladie se manifestant plus tôt que prévu (de 10 à 20 ans plus tôt que dans la population générale);
- une même maladie présente chez plus d'une personne de la famille proche;
- certaines combinaisons de maladies dans une famille (par exemple, maladie cardiaque et diabète).

Les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie sont celles qui ont le plus à gagner en effectuant des changements à leur mode de vie et des tests de dépistage, favorisant une modification des habitudes de vie qui ne sont pas saines comme le tabagisme, l'inactivité physique et une mauvaise alimentation. Dans bien des cas, l'adoption d'un mode de vie plus sain peut réduire le risque de maladie. Les tests de dépistage (comme la mammographie et la détection du cancer colorectal) peuvent permettre de détecter des maladies, telles que le cancer à un stade précoce, lorsqu'elles sont le plus faciles à traiter. Les tests de dépistage peuvent aussi détecter les facteurs de risque de maladies, telles que l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle, qui peuvent être traités afin de réduire le risque de contracter une maladie.

**REMARQUE IMPORTANTE:** Toute référence aux mises à l'essai, tests, résultats de test ou examens exclut les tests génétiques. Par test génétique, on entend un test qui analyse l'ADN, l'ARN ou les chromosomes à des fins telles que la prédiction d'une maladie ou des risques de transmission verticale, la surveillance, le diagnostic et le pronostic.

**Remarque :** Le projet de loi sur la non-discrimination génétique est devenu loi le 4 mai 2017, interdisant l'utilisation de tout renseignement issu d'un test génétique pour la tarification des contrats d'assurance. Quiconque contrevient à cette loi s'expose à une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

# Troubles médicaux

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Abus d'alcool ou de drogues</b> Consommation considérée comme un abus, une dépendance ou un risque, et consommation excessive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Consommation déclarée</li> <li>■ Diagnostic d'abus ou de dépendance</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Membre d'un groupe d'entraide</li> <li>■ Traitement médicamenteux</li> <li>■ Facteurs de comorbidité</li> <li>■ Complications médicales</li> <li>■ Stabilités professionnelle et financière</li> <li>■ Dossier de conduite automobile</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT, questionnaire sur l'usage d'alcool ou de drogues, examen paramédical, analyse sanguine, RBVA</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Précisions sur le traitement</li> <li>■ Lettre énonçant les aspects qui jouent en faveur du proposant : emploi stable, participation à un groupe d'entraide, etc.</li> </ul>	<p><b>Abstinence pendant 0 à 5 ans :</b> refus</p> <p><b>Abstinence pendant 5 à 7 ans :</b> surprime, période d'attente minimum de 90 jours et durée maximum des prestations de 5 ans</p> <p><b>Abstinence pendant 7 ans et plus :</b> standard jusqu'à + 50 % avec période d'attente de 90 jours</p>
<p><b>Accident ischémique transitoire (AIT)</b> Problème de circulation du sang au cerveau – les symptômes durent moins de 24 heures.</p> <p><b>Accident vasculaire cérébral (AVC)</b> Diminution de l'apport de sang au cerveau, qui entraîne un déficit neurologique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récidives</li> <li>■ Déficience résiduelle</li> <li>■ Séquelles neurologiques</li> <li>■ Pas de diabète</li> <li>■ Pas de maladie rénale, cardiovasculaire</li> <li>■ Pas d'hypertension artérielle</li> <li>■ Non-fumeur</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Accident ischémique transitoire (AIT)</b> <b>Épisode isolé, rétablissement complet, aucun autre trouble entraînant une surprime, séquelles minimes, le proposant a un emploi régulier et travaille à temps plein</b></p> <p><b>0 à 2 ans :</b> refus</p> <p><b>2 à 5 ans :</b> surprime de + 75 à 100 % avec durée des prestations de 5 ans</p> <p><b>Accident vasculaire cérébral (AVC)</b> <b>Épisode isolé, rétablissement complet, aucun autre trouble entraînant une surprime, séquelles minimes, le proposant a un emploi régulier et travaille à temps plein</b></p> <p><b>0 à 5 ans :</b> refus</p> <p><b>Après 5 ans :</b> surprime de + 75 à 150 % avec réduction de la durée des prestations</p>
<p><b>Acromégalie</b> Maladie de l'hypophyse. Sécrétion excessive de l'hormone de croissance.</p>			<p><b>Refus</b></p>
<p><b>Affections cutanées : Dermatite; Eczéma; Psoriasis</b> La plupart des éruptions cutanées sont éphémères et liées à une infection virale ou à une réaction allergique. Il est important de noter les conséquences qu'une affection cutanée peut avoir sur les activités professionnelles du proposant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aiguë</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Restrictions dans l'exercice des fonctions professionnelles</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Symptômes résiduels</li> <li>■ Type</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Trouble léger, ne nuit pas au travail :</b> standard</p> <p><b>Autrement :</b> exclusion probable</p> <p><b>Dermatite exfoliative, trouble présent :</b> décision différée</p> <p><b>Rétablissement complet depuis au moins un an, aucun symptôme résiduel, aucune maladie systémique :</b> période d'attente minimum de 90 jours</p>
<p><b>Amputations</b> Ablation complète ou partielle d'un membre ou d'un segment de membre pouvant être causée par un trauma, une infection ou une maladie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Évaluation minutieuse des fonctions professionnelles</li> <li>■ Antécédents d'emploi stable comme preuve des facultés d'adaptation du proposant</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Un seul membre, par suite d'un trauma, aucune restriction dans l'exercice des fonctions :</b> exclusion et possible surprime</p> <p><b>Autre :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)</p> <p><b>Nuit à l'exercice des fonctions :</b> refus</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Anémie</b> Carence en fer  Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (d'où une carence en fer) causée par une perte de sang, une production insuffisante de globules rouges par la moelle osseuse ou une destruction prématurée des globules rouges.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type d'anémie</li> <li>■ Cause, si connue</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Précisions sur les tests effectués et les orientations vers des spécialistes</li> <li>■ Résultats de l'analyse sanguine</li> <li>■ Médicaments</li> <li>■ Troubles reliés</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ formule sanguine complète</li> <li>■ Précisions sur le suivi</li> </ul>	<b>Le taux dépend du type d'anémie, de l'étendue et des médicaments</b>  <b>Carence en fer (Anémie hypochromique, Anémie microcytaire)</b>  <b>Trouble présent, léger à modéré, contrôlé médicalement, aucun autre trouble :</b> standard jusqu'à + 50 %  <b>Autre :</b> tarification en fonction de la cause, de la gravité
<b>Angine de poitrine</b> Douleur thoracique causée par une réduction du débit sanguin vers le cœur en raison d'une coronaropathie.			Voir Anomalies du cœur
<b>Ankylose</b> Immobilité ou raideur d'une articulation découlant d'une maladie, d'un trauma ou d'une intervention chirurgicale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Étendue</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Nuit à l'exercice de ses fonctions professionnelles?</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Exclusion des articulations atteintes et possible surprime en raison de complications ou de maladies sous-jacentes</b>
<b>Anomalies du cœur : Angine de poitrine</b>			<b>Refus</b>
<b>Anomalies du cœur : Coronaropathie</b>			<b>Refus</b>
<b>Anomalies du cœur : Hypertrophie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge</li> <li>■ Gravité</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECG</li> <li>■ Radiographie</li> </ul>	<b>Selon l'âge, la gravité et en supposant qu'il n'y ait pas d'autres anomalies du cœur ou révélées par l'ECG et selon la cause de l'hypertrophie :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)
<b>Anomalies du cœur : Prolapsus de la valve mitrale</b> Habituellement bénin et asymptomatique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Symptômes</li> <li>■ Aucun autre signe de cardiopathie</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Échocardiogramme</li> </ul>	<b>Asymptomatique, aucune autre preuve de maladie cardiaque, souffle systolique d'une intensité de 1/6 ou 2/6 :</b> standard  <b>Symptomatique :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)
<b>Anomalies du cœur : Souffle</b> Bruit anormal causé par le flux sanguin "entendu à l'auscultation du cœur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonctionnel ou organique</li> <li>■ Âge</li> <li>■ Type d'investigation</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Complications</li> <li>■ Progression</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Échocardiogramme</li> </ul>	<b>Fonctionnel/bénin :</b> standard  <b>Organique :</b> considération individuelle
<b>Anomalies du cœur : Tachycardie</b> Pouls rapide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preuve d'une maladie cardiaque</li> <li>■ Autres symptômes</li> <li>■ Pouls</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECG</li> </ul>	<b>Selon la fréquence et la durée des épisodes et le degré de contrôle :</b> standard jusqu'au refus
<b>Anorexie mentale</b>	Voir Troubles de l'alimentation		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Apnée du sommeil</b> Arrêt de la respiration pendant le sommeil. Provoque une fatigue diurne pouvant entraîner une augmentation des risques d'accident. Elle est souvent associée à un excès de poids et de consommation d'alcool. Le diagnostic est posé au moyen d'une évaluation du sommeil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Réponse au traitement/observance</li> <li>■ Risques professionnels</li> <li>■ Aucune infraction liée à la conduite automobile</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Arythmie du cœur</li> <li>■ Fumeur?</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Évaluation du sommeil</li> </ul>	<p><b>Obstructive, pas d'arythmie du cœur, aucun traitement ou avec traitement donnant un résultat positif :</b></p> <p><b>Légère :</b> standard jusqu'à + 25 %</p> <p><b>Modérée, traitement donnant un résultat positif</b>  <b>0 à 1 an :</b> + 50 %  <b>1 an et plus :</b> standard</p> <p><b>Modérée, sans traitement ou non-observance du traitement avec VSPPC (« CPAP ») :</b> refus</p> <p><b>Grave :</b> refus</p>
<p><b>Artériosclérose</b> Durcissement des artères. Épaississement généralisé des parois des artères, qui deviennent plus fermes, sinueuses et moins élastiques. La capacité artérielle est réduite, ce qui nuit à la circulation du sang. Toutes les artères du corps peuvent être touchées. Bien que ce processus soit normal chez les personnes âgées, il en est tout autrement lorsque cette affection fait son apparition <b>chez de jeunes personnes</b>. Si le proposant souffre d'autres troubles cardiovasculaires, la proposition est habituellement refusée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Artères touchées</li> <li>■ Âge</li> <li>■ Étendue du trouble</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECG</li> </ul>	<p><b>Fumeur :</b> refus</p> <p><b>Non-fumeur, aucune autre anomalie, selon la gravité, l'endroit et l'âge lors du diagnostic</b></p> <p><b>Meilleur cas :</b> surprime avec réduction de la durée des prestations</p>
<p><b>Arthrite : Non rhumatoïde</b> Inflammation des articulations. L'arthrite est une inflammation d'une ou de plusieurs articulations. Elle est principalement causée par un trauma, une infection, une dégénérescence, une réaction toxique ou un trouble du métabolisme. Elle peut être la caractéristique principale d'une maladie (p. ex., arthrite rhumatoïde) ou une caractéristique secondaire d'une maladie systémique (p. ex., maladie intestinale inflammatoire). C'est une affection chronique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Difformités</li> <li>■ Gravité de l'affection</li> <li>■ Articulations touchées</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Conséquences sur les fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Une seule articulation, arthrite légère, aucune difformité résiduelle :</b> possibilité de taux standard</p> <p><b>Deux articulations ou plus :</b> exclusion</p>
<p><b>Arthrite : Rhumatoïde</b> Y compris polyarthrite psoriasique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Confirmée par la présence du facteur rhumatoïde dans le sérum</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Tâches liées au travail</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Articulations atteintes</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Résultats de l'analyse sanguine indiquant la présence du facteur rhumatoïde</li> </ul>	<p><b>Légère :</b> exclusion et surprime. Possible réduction de la durée des prestations en fonction de l'emploi</p> <p><b>Modérée, aucune complication :</b> + 25 à 50 % avec période d'attente de 90 jours et durée des prestations maximum de 5 ans</p>
<p><b>Arthrose</b> Accélération du processus de vieillissement qui entraîne des lésions dégénératives des articulations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gravité</li> <li>■ Une ou plusieurs articulations</li> <li>■ Exigences professionnelles sur le plan physique</li> </ul>		<p><b>Découvertes fortuites, légère à modérée, asymptomatique :</b> standard, période d'attente de 90 jours</p> <p><b>Autre :</b> en fonction des symptômes, de l'emploi et de la gravité : considération individuelle : exclusion jusqu'à refus</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Asthme</b>            Trouble inflammatoire chronique des voies aériennes qui provoque un essoufflement et qui peut être déclenché par des allergènes, des agents irritants, l'air froid ou l'exercice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Date du diagnostic</li> <li>■ Gravité des symptômes</li> <li>■ Fréquence des crises</li> <li>■ Type de médicament</li> <li>■ Observance du traitement médicamenteux</li> <li>■ Hospitalisation ou visites</li> <li>■ Limitation d'activités</li> <li>■ Antécédents de tabagisme</li> <li>■ Troubles reliés</li> <li>■ Noter tout facteur déclencheur au travail (animaux, pollen, poussière)</li> </ul>	<p><b>Exigence</b> : DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copie des résultats des explorations fonctionnelles respiratoires et précisions sur les hospitalisations</li> <li>■ Niveau d'activité</li> </ul>	<p><b>Léger</b> : Ne nuit pas à l'exercice des fonctions : standard</p> <p><b>Fumeurs</b> : Meilleur cas : exclusion, surprime et durée des prestations de 2 ans</p> <p><b>Modéré</b> : Absence du travail, pas de visites à l'hôpital au cours des 2 dernières années : surprime de 25 à 50 % avec période d'attente minimum de 90 jours et possible exclusion</p> <p><b>Grave</b> : Crises quotidiennes, hospitalisation au cours des 2 dernières années ou usage régulier de stéroïdes oraux pour contrôler l'asthme : refus</p> <p><b>Nuit à l'exercice des fonctions professionnelles</b> : considération individuelle (proposition à l'essai)</p>
<p><b>Avortement spontané (fausse couche)</b>            Interruption de la grossesse avant que le fœtus ne soit capable de mener une vie extra-utérine indépendante.</p>		<p><b>Exigence</b> : DMT</p>	<p><b>1 ou 2 au cours de la dernière année</b> : exclusion</p> <p><b>1 ou 2 remontant à plus d'un an</b> : standard</p> <p><b>Plus de 2, aucune naissance normale depuis</b> : exclusion</p>
<p><b>Boulimie mentale</b></p>	<p>Voir Troubles de l'alimentation</p>		
<p><b>Bronchite</b>            Inflammation des conduits aériens bronchiques.</p> <p>La bronchite aiguë est généralement causée par une infection, mais elle peut aussi provenir de l'inhalation d'agents irritants tels que la fumée ou les gaz toxiques. Les symptômes courants comprennent la toux, la fièvre et quelquefois une douleur thoracique. L'inflammation est temporaire et les crises entraînent rarement une invalidité.</p> <p>La bronchite chronique prédispose le sujet à de fréquentes crises de bronchite aiguës.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Causes</li> <li>■ Aiguë ou chronique</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<p><b>Exigence</b> : DMT</p>	<p><b>Aiguë, crise infectieuse légère isolée</b> : standard après le rétablissement</p>
<p><b>Bursite : Synovite; Ténosynovite</b>            Inflammation des bourses séreuses situées entre les tendons et les muscles ou de la gaine séreuse péri-tendineuse qui recouvre les tendons ou le tendon touché.</p> <p>La bursite peut être de cause inconnue, faire suite à un trauma ou être associée à une maladie rhumatismale. Elle peut être causée par des mouvements répétitifs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence</b> : DMT</p>	<p><b>Symptômes en cours</b> : exclusion</p> <p><b>1 ou 2 épisodes aigus, asymptomatique depuis au moins 1 an</b> : possibilité de taux standard</p> <p><b>Chronique ou plus de 2 épisodes aigus</b> : exclusion et possible surprime/ réduction de la durée des prestations en fonction de l'emploi</p>
<p><b>Calcul néphrétique (calcul rénal)</b></p>	<p>Voir Troubles des reins</p>		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Calculs biliaires: (pierres au foie)</b> Cholélithiase	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diagnostic formel</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Proposant opéré et rétabli depuis 6 mois :</b> standard jusqu'à l'exclusion <b>Sans opération :</b> exclusion
<b>Cancer : Autre que le cancer de la peau</b> (Pour le cancer de la peau, voir Tumeurs de la peau) Tumeur qui a tendance à croître, à envahir les tissus environnants et à s'étendre (métastaser) à d'autres parties du corps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Antécédents familiaux</li> <li>■ Date du diagnostic</li> <li>■ Pathologie</li> <li>■ Type de traitement</li> <li>■ Confirmation que la tumeur a été enlevée complètement</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Stade</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapport de pathologie avec stade et suivi régulier</li> </ul>	<b>Selon le type, meilleur cas, 5 à 7 ans après la fin du traitement, suivi adéquat :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)
<b>Carcinome basocellulaire</b>	Voir Tumeurs de la peau		
<b>Cataracte</b>	Voir Troubles des yeux		
<b>Cécité</b>	Voir Troubles des yeux		
<b>Cholestérol : Taux élevé</b> Mesures prises de préférence après un jeûne de 12 heures. Le taux élevé peut être primaire ou secondaire – lié à une diète, à des activités physiques et autres facteurs. Le taux élevé de cholestérol peut engendrer une augmentation du risque de coronaropathie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mesures actuelle et antérieures</li> <li>■ Médicaments</li> <li>■ Observance du traitement médicamenteux</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Autres facteurs de coronaropathie</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analyse sanguine à jeun</li> <li>■ Taux de cholestérol total, LDL et HDL</li> </ul>	<b>Contrôlé depuis 1 an et pas de problème connexe :</b> standard <b>Autre :</b> considération individuelle, combinaison de surprime, réduction de la durée des prestations ou réduction des prestations, jusqu'au refus
<b>Chorée de Huntington</b> Maladie héréditaire causant des mouvements involontaires des muscles.			<b>Refus</b>
<b>Cirrhose du foie</b>			<b>Refus</b>
<b>Colite</b>	Voir Troubles des intestins		
<b>Commotion cérébrale</b> Perte transitoire de la conscience après un traumatisme crânien, qui n'entraîne aucun trouble neurologique résiduel grave.	<b>Symptômes :</b> type et durée Symptômes résiduels Perte de la conscience de plus de 6 heures Événements multiples	<b>Exigence :</b> DMT	<b>3 mois après l'épisode, selon la gravité de la blessure, la durée de la perte de conscience, le temps de rétablissement, et s'il n'y a aucune séquelle :</b> probablement standard <b>Avec séquelles :</b> considération individuelle jusqu'au refus (proposition à l'essai)
<b>Coronaropathie</b>	Voir Anomalies du cœur		
<b>Crise cardiaque</b> Infarctus du myocarde	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge au moment de l'infarctus du myocarde</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Tension artérielle et autres facteurs cardiaques</li> <li>■ Restrictions</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur les douleurs thoraciques <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECG</li> <li>■ Radiographie</li> </ul>	<b>Proposant âgé de moins de 40 ans :</b> refus <b>Âgé de plus de 40 ans au moment du diagnostic</b> <b>Un seul vaisseau touché, angiographie</b> <b>0 à 5 ans :</b> refus <b>5 ans et plus :</b> considération individuelle <b>Deux vaisseaux touchés ou plus ou aucune angiographie coronaire :</b> refus
<b>Cystite</b> infection bactérienne de l'appareil urinaire inférieur		<b>Exigences :</b> DMT, analyse d'urine	<b>Épisode isolé, trouble présent :</b> exclusion <b>Épisode isolé, rétablissement :</b> standard <b>Épisodes à répétition, selon les antécédents :</b> exclusion ou standard

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Décollement de la rétine; Décollement rétinien</b>	Voir Troubles des yeux		
<b>Dépression</b>	Voir Troubles affectifs et d'adaptation; Anxiété		
<b>Dépression majeure</b>	Voir Troubles affectifs et d'adaptation; Anxiété		
<b>Déviatation de la colonne vertébrale</b>	Voir Troubles du dos		
<b>Diabète</b> Maladie métabolique chronique résultant de l'incapacité de l'organisme de produire de l'insuline ou de l'utiliser efficacement, qui provoque des fluctuations de glycémie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge à l'apparition des symptômes</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Degré de contrôle</li> <li>■ Complications éventuelles</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Tension artérielle</li> </ul>	<b>Exigences :</b> DMT, analyse sanguine <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dossiers complets avec suivi, surveillance et contrôle réguliers</li> <li>■ Mode de vie actif</li> </ul>	<b>Diabète insulino-dépendant</b> <b>Âgé de plus de 30 ans au moment du diagnostic, maladie bien contrôlée depuis plus de 5 ans, le proposant prend ses médicaments et se soumet à des examens réguliers, pas d'autres facteurs de risque, y compris le tabagisme</b> <b>Meilleur cas :</b> surprime et durée maximum des prestations de 2 ans
<b>Diabète de type 1 ou diabète insulino-dépendant (DID)</b> Anciennement connu sous le nom de « diabète juvénile », il est habituellement diagnostiqué avant l'âge de 40 ans.  En général, les symptômes apparaissent rapidement.			<b>Diabète non insulino-dépendant</b> <b>Âgé de plus de 30 ans au moment du diagnostic, maladie bien contrôlée depuis plus de 2 ans, le proposant prend ses médicaments et se soumet à des examens réguliers, pas d'autres facteurs de risque</b> <b>Meilleur cas :</b> surprime et durée maximum des prestations de 5 ans
<b>Diabète de type 2 ou diabète non insulino-dépendant (DNID)</b> Anciennement connu sous le nom de « diabète de l'adulte ».			<b>Diabète gestationnel</b> <b>À n'importe quel âge, durant la grossesse, jusqu'à au moins 3 mois suivant l'accouchement :</b> décision différée  <b>Âge lors de la proposition :</b> <b>Moins de 35 ans :</b> surprime de + 75 %, durée des prestations de 5 ans <b>36 à 49 ans :</b> surprime de + 50 % <b>50 ans et plus :</b> standard
<b>Diabète gestationnel (diabète de grossesse)</b> Intolérance au glucose ayant débuté au cours de la grossesse – les femmes atteintes peuvent demeurer diabétiques après leur grossesse, se rétablir ou risquer de développer un diabète plus tard.			
<b>Diverticulite</b> Inflammation d'un diverticule.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Complications</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Trouble présent ou proposant opéré avec rétablissement :</b> habituellement standard avec période d'attente de 90 jours  <b>Récidives ou avec complications :</b> exclusion
<b>Diverticulose</b> Présence de poches, surtout dans l'intestin.			
<b>Douleurs thoraciques : Origine incertaine</b> Peut résulter de causes variées (hernie hiatale, troubles pulmonaires, crises de panique, troubles musculaires ou cardiaques, etc.). Il est important de prendre en note la cause, la durée et le traitement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge</li> <li>■ Cause des douleurs</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Provoquées par de l'exercice/ soulagées par le repos</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur les douleurs thoraciques  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECG actuel et antérieurs</li> <li>■ Examens cardiaques</li> </ul>	<b>Causées par une cardiopathie :</b> refus <b>Cause indéterminée au cours de la première année :</b> décision différée <b>Après un an :</b> considération individuelle, tarification en fonction de la cause
<b>Emphysème</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voir Troubles des poumons</li> </ul>		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Endométriose</b> Tissu endométrial présent à l'extérieur de la cavité utérine.</p>		<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Proposante non opérée, encore sous traitement :</b> exclusion</p> <p><b>Dans les 3 mois suivant l'opération :</b> exclusion</p> <p><b>Grave ou récidivante :</b> considération individuelle</p>
<p><b>Entorses ou claquages, au dos, au cou ou cervicales</b> Trouble musculo-squelettique le plus fréquent souvent causé par une mauvaise utilisation du dos lors de la levée de charges, une mauvaise posture ou un excès de poids. La douleur a tendance à revenir.</p> <p><b>Coup de fouet cervical :</b> blessure qui survient le plus souvent à la suite d'un accident d'automobile, en raison d'une hyperextension des ligaments du cou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disque atteint?</li> <li>■ Absence du travail</li> <li>■ Épisodes isolé ou à répétition?</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> <li>■ Taille et poids</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT et Questionnaire sur les maux de dos</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copie de toute radiographie</li> </ul>	<p><b>Atteinte du disque :</b> même tarification que pour une « hernie discale »</p> <p><b>Épisode isolé, trouble léger, moins d'une semaine et aucun arrêt de travail, selon les fonctions professionnelles</b></p> <p><b>0 à 1 an :</b> exclusion</p> <p><b>Plus d'un an :</b> habituellement taux standard avec période d'attente de 90 jours</p> <p><b>Sinon, selon les fonctions professionnelles, les récidives, la fréquence, la gravité et la durée des épisodes, et l'absence du travail :</b> exclusion à refus</p>
<p><b>Épilepsie</b> Trouble du cerveau se traduisant par des crises de convulsions à répétition.</p> <p>Convulsions caractérisées par des épisodes récurrents et brefs d'activité incontrôlée produite par une stimulation électrique anormale dans le cerveau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type, traitement</li> <li>■ Nombre de crises</li> <li>■ Fréquence des crises</li> <li>■ Période écoulée depuis la dernière crise</li> <li>■ Profession (La conduite automobile et la participation à des professions ou à des activités parallèles peuvent augmenter le risque d'accident)</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Considération individuelle (proposition à l'essai)</b></p>
<p><b>Étourdissements</b></p> <p><b>Fibromyalgie</b> Fibrosite; Syndrome de douleurs myofasciales; Syndrome de douleur chronique.</p> <p>Douleur et raideur généralisées avec des « points douloureux » caractéristiques. On peut observer des troubles mécaniques du cou et du dos et des troubles du sommeil, et les plaintes relatives à la dépression ou à l'anxiété sont fréquentes.</p> <p>L'affection tend à être chronique (bien qu'il ne s'agisse PAS du syndrome de fatigue chronique).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Date de l'apparition</li> <li>■ Type de traitement</li> <li>■ Séquelle</li> <li>■ Autres plaintes</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Tarification en fonction de la cause</b></p> <p><b>Symptômes présents ou pendant les 5 dernières années :</b> refus</p> <p><b>5 ans après le rétablissement :</b> considération individuelle</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Fractures</b> Rupture de continuité d'un os pouvant être simple (fractures fermées) ou complexe (fractures ouvertes). La rupture est habituellement causée par un trauma, mais elle peut être secondaire à une maladie.</p> <p>Certains types de fracture exigent des broches, vis, plaques qui peuvent augmenter le risque d'infection et qui, plus tard, devront être retirées ou remplacées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Séquelle</li> </ul>	<b>Exigence</b> : DMT	<b>Après rétablissement complet, aucune séquelle, avec ou sans pièces en place</b> : standard avec période d'attente de 90 jours
<b>Fractures : Dos</b>	Voir Troubles du dos		
<b>Gastrite</b>	Voir Troubles de l'estomac		
<b>Glaucome</b>	Voir Troubles des yeux		
<b>Glomérulonéphrite</b>	Voir Troubles des reins		
<b>Goitre</b>	Voir Troubles de la thyroïde		
<p><b>Goutte</b> Maladie caractérisée par un taux élevé d'acide urique, avec crises d'arthrite aiguës et parfois calculs rénaux.</p> <p>Trouble métabolique affectant principalement les hommes d'âge moyen. L'hypertension artérielle et l'obésité accompagnent souvent la goutte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nombre de crises</li> <li>■ Symptômes</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Tension artérielle</li> <li>■ Autres troubles cardiovasculaires</li> </ul>	<b>Exigence</b> : DMT	<p><b>Aucune anomalie cardiovasculaire ou rénale</b></p> <p><b>Trouble présent</b>  <b>Crises légères, peu fréquentes</b> : + 25 à 50 %, exclusion  <b>Crises modérées, récurrentes</b> : + 25 %, exclusion  <b>Crises graves, récurrentes</b> : refus</p> <p><b>Antécédents</b>  <b>Épisode isolé, rétablissement complet</b>  <b>0 à 3 ans</b> : exclusion  <b>Après 3 ans et asymptomatique</b> : standard</p>
<b>Grossesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trimestre</li> <li>■ Complications antérieures</li> <li>■ État actuel</li> </ul>	<b>Exigence</b> : DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ État actuel</li> <li>■ Analyse d'urine</li> </ul>	<p><b>Durant les 6 premiers mois d'une grossesse normale</b> : exclusion pour grossesse, y compris complications et/ou traitement, sous réserve d'une analyse d'urine et d'un rapport du médecin traitant</p> <p><b>Toute complication ou après le sixième mois de grossesse</b> : refus jusqu'au retour au travail à temps plein</p> <p><b>Antécédents de grossesse avec complications</b> : habituellement exclusion si la proposante est en âge d'avoir des enfants</p>
<p><b>Hémochromatose</b> Accumulation excessive de fer dans le corps (surcharge en fer) pouvant causer des dommages aux organes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Sexe</li> <li>■ Symptômes</li> <li>■ Complications</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Contrôle</li> </ul>	<b>Exigences</b> : DMT, analyse sanguine et hépatique	<p><b>Meilleur cas</b> : asymptomatique, analyse de sang et tests de fonction hépatique normale (foie et fer), pas de comorbidité : possibilité de taux standard</p> <p><b>Autre</b> : considération individuelle</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Hépatite</b> Inflammation du foie souvent caractérisée par une augmentation des enzymes hépatiques. Ce type d'inflammation du foie a des causes diverses et peut être aigu ou chronique. Plusieurs virus peuvent causer une maladie de courte durée. Des problèmes chroniques apparaissent sur une plus longue période lorsque la personne n'a pas pu éliminer le virus déclenchant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Taux actuel d'enzymes hépatiques</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tests de fonction hépatique</li> <li>■ Dépistage de l'hépatite</li> </ul>	<b>Trouble présent, tous les types :</b> refus <b>Antécédents, rétablissement complet, analyse de sang normale (foie et hépatite)</b> <b>Hépatite A ou B avec test de détection antigène/anticorps confirmant la guérison</b> <b>Dans les 6 mois :</b> décision différée <b>Après 6 mois :</b> standard <b>Porteur de l'hépatite B :</b> considération individuelle <b>Hépatite C ou D :</b> refus <b>Autre :</b> considération individuelle
<b>Hernie discale</b>	Voir Troubles du dos		
<b>Hernie : Inguinale; Hiatale; Ombilicale</b> Protrusion de tissus ou d'organes. Protrusion d'une partie ou de la totalité d'un organe ou d'une structure corporelle à travers une zone de faiblesse ou une anomalie de la paroi de cet organe. Il est important de prendre en note le type et l'endroit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Sans opération :</b> standard avec période d'attente de 90 jours, selon les fonctions professionnelles du proposant <b>Avec opération :</b> plus de 3 mois, corrigée chirurgicalement, rétablissement complet : standard
<b>Herpès zoster</b>	Voir Zona		
<b>Hypertension artérielle (HTA)</b>	Voir Tension artérielle élevée		
<b>Hyperthyroïdie ou Hypothyroïdie</b>	Voir Troubles de la thyroïde		
<b>Hypoglycémie</b> Faible taux de glucose dans le sang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diabète?</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Contrôle</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Avec diabète :</b> Voir Diabète <b>Réactionnelle, traitée adéquatement, asymptomatique</b> <b>0 à 6 mois :</b> décision différée <b>Diagnostic il y a 6 mois à 2 ans :</b> surprime +50 % <b>Diagnostic il y a plus de 2 ans :</b> standard
<b>Hystérectomie</b> Ablation chirurgicale de l'utérus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raison</li> <li>■ Rétablissement</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapport de pathologie</li> </ul>	<b>Cause non maligne, rétablissement complet, aucune séquelle, retour au travail :</b> standard avec période d'attente de 90 jours <b>Cause maligne :</b> voir Cancer
<b>Infarctus du myocarde</b> Crise cardiaque	Voir Crise cardiaque		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Insomnie</b> Difficulté du sujet à s'endormir ou à rester endormi.</p> <p>Il est normal d'avoir des troubles du sommeil passagers. Par contre, l'insomnie prolongée peut révéler des troubles physiques ou d'adaptation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Étendue</li> <li>■ Durée</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Restrictions dans l'exercice des fonctions</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Cause connue :</b> tarification en fonction de la cause et comme ci-dessous</p> <p><b>Légère, peu fréquente :</b> habituellement standard</p> <p><b>Autre :</b> considération individuelle</p>
<b>Insuffisance rénale</b>	Voir Troubles des reins		
<b>Kyste ovarien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Traitement</li> <li>■ Kyste bénin</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapport de pathologie</li> </ul>	<b>Kyste bénin :</b> standard, période d'attente de 90 jours
<b>Lupus érythémateux disséminé (LED)</b>			<b>Refus</b>
<b>Lupus : Lupus discoïde; Lupus érythémateux disséminé (LED)</b>	Voir Troubles des tissus conjonctifs		
<p><b>Luxations</b> Déplacement d'une articulation pouvant être causé par un trauma ou une maladie.</p> <p>Les récurrences sont fréquentes. Une chirurgie est souvent nécessaire dans les cas chroniques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Articulation touchée</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<p><b>Un épisode aigu au cours de la première année :</b> exclusion</p> <p><b>Après un an, aucun symptôme :</b> standard</p> <p><b>Deux épisodes ou plus :</b> exclusion</p>
<p><b>Maladie céliaque</b> Affection chronique caractérisée par une malabsorption causée par une intolérance au gluten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilité du poids</li> <li>■ Antécédents familiaux</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<p><b>Diagnostic dans l'année :</b> décision différée</p> <p><b>Plus d'un an, contrôlée, sous réserve du poids :</b> standard</p>
<p><b>Maladie d'Addison</b> Maladie des glandes surrénales caractérisée par l'atrophie de la corticosurrénale et une insuffisance hormonale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Aiguë ou chronique</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<p><b>Aiguë, épisode isolé, rétablissement complet sans séquelle depuis plus de 3 ans :</b> considération individuelle</p> <p><b>Autre :</b> refus</p>
<p><b>Maladie de Crohn</b> Maladie inflammatoire chronique du tractus gastro-intestinal, généralement diagnostiquée d'abord chez les jeunes adultes. Parmi les complications, notons l'obstruction et un risque accru de développer un cancer. Les complications sont semblables à celles de la colite ulcéreuse, et une chirurgie peut s'avérer nécessaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gravité</li> <li>■ Durée</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Âge lors de la première crise</li> <li>■ Perte de poids</li> <li>■ Augmentation du risque de cancer</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preuve d'une surveillance régulière des voies gastro-intestinales</li> <li>■ Poids stable</li> <li>■ Mode de vie actif</li> </ul>	<p><b>Dans les 2 ans suivant la rémission :</b> décision différée</p> <p><b>Après 2 ans :</b> selon le degré, exclusion et possible surprime/réduction de la durée des prestations</p>
<b>Maladie de Graves</b>	Voir Troubles de la thyroïde		
<b>Maladie de Hodgkin</b> Hypertrophie des ganglions lymphatiques.	Voir Cancer		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Maladie de Ménière</b>	Voir Troubles des oreilles		
<b>Maladie de Parkinson</b> Affection progressive et dégénérative du système nerveux central.			<b>Refus</b>
<b>Maladie de Raynaud</b> Troubles circulatoires dans les extrémités, qui entraînent de l'engourdissement et de la pâleur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Symptômes</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Restrictions</li> <li>■ Tâches liées au travail</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Maladie de Raynaud</b> <b>Examen complet, diagnostic confirmé, symptômes légers ne causant aucune restriction ou trouble : standard</b> <b>Autre : considération individuelle</b> <b>Phénomène de Raynaud : considération individuelle en fonction de toute affection sous-jacente</b>
<b>Maladie ou syndrome de Cushing</b> Maladie touchant les glandes surrénales. Cette maladie résulte habituellement d'un adénome pituitaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Traitement</li> <li>■ Aucune séquelle</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Pas d'hypertension artérielle ni de diabète</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Habituellement refus</b> <b>Meilleur des cas, cause bénigne apparue il y a plus de 3 ans : surprime et réduction de la durée des prestations</b>
<b>Maladie fibrokystiques des seins</b> Caractérisée par la formation de kystes entraînant des douleurs et de la sensibilité, elle est établie au moyen d'une mammographie ou d'une biopsie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ État</li> <li>■ Antécédents familiaux de cancer du sein</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b> <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protocole opératoire avec rapport de pathologie</li> </ul>	<b>Trouble présent, formellement bénin</b> <b>Pas d'antécédents familiaux de cancer du sein : standard, période d'attente de 90 jours</b> <b>Antécédents familiaux de cancer du sein : exclusion</b> <b>Antécédents, forme bénigne : standard avec période d'attente de 90 jours</b> <b>Mammographie ou biopsie en attente : décision différée</b>
<b>Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)</b>	Voir Troubles des poumons		
<b>Marijuana (consommation de)</b>	Voir Usage de drogues		
<b>Mastoïdite</b>	Voir Troubles des oreilles		
<b>Maux de tête : Migraines</b>	Voir Migraines		
<b>Méningite</b> Inflammation du cerveau ou de la moelle épinière.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Rétablissement</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b> <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test du VIH</li> </ul>	<b>Causée par une bactérie ou un virus, rétablissement complet depuis au moins 6 mois, aucune séquelle, ne constitue pas une manifestation secondaire d'une autre maladie : standard</b> <b>Autre : considération individuelle (proposition à l'essai)</b>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Migraines</b> Céphalée vasculaire grave causée par des modifications du diamètre des vaisseaux sanguins intracrâniens et extracrâniens. Anomalies visuelles (taches aveugles, éclairs [« flashes »]), difficulté à parler, paralysie, céphalée pulsatile et nausées caractérisent souvent la migraine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gravité</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Cause</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Légères, occasionnelles</b> : standard <b>Modérées, récurrentes</b> : standard avec période d'attente de 90 jours <b>Graves, invalidantes pendant plus de 7 jours, à répétition</b> : considération individuelle
<b>Myosite</b> Inflammation des muscles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Rétablissement</li> <li>■ Séquelle</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Une seule crise, aucune malformation, rétablissement complet, période d'attente de 90 jours</b> : <b>0 à 1 an</b> : standard jusqu'à + 25 % <b>1 an et plus</b> : standard <b>Crises à répétition, aucune malformation, rétablissement complet, période d'attente de 90 jours</b> : <b>0 à 2 ans</b> : + 25 à 50 % <b>2 à 3 ans</b> : standard jusqu'à + 25 % <b>Plus de 3 ans</b> : standard
<b>Nævus dysplasique</b>	Voir Tumeurs de la peau		
<b>Narcolepsie</b> Trouble du sommeil caractérisé par des excès de somnolence diurne qui peuvent mener à des « crises de sommeil ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Réponse à la médication</li> <li>■ Risques professionnels</li> <li>■ Infractions liées à la conduite automobile</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Épisode au cours des 3 dernières années</b> : décision différée <b>Remontant à plus de 3 ans, selon la gravité, la profession et le dossier de conduite</b> : considération individuelle
<b>Néphrectomie</b>	Voir Troubles des reins		
<b>Néphrite</b>	Voir Troubles des reins		
<b>Obésité</b>	Voir le tableau des tailles et poids		
<b>Pancréatite</b> Inflammation du pancréas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aiguë</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Complications</li> <li>■ Aucune infraction liée à la consommation d'alcool</li> </ul>	<b>Exigence : DMT</b>	<b>Aiguë, aucun problème relatif à l'alcool</b> <b>Légère, dernier épisode au cours de l'année</b> : décision différée <b>Après 1 an</b> : standard ou surprime <b>Épisode isolé, grave</b> <b>0 à 2 ans</b> : décision différée <b>Plus de 2 ans</b> : standard jusqu'à surprime de + 75 %, durée des prestations de 5 ans <b>Épisodes à répétition, légère</b> <b>0 à 2 ans</b> : décision différée <b>Plus de 2 ans</b> : + 25 à 50 %, période d'attente de 90 jours <b>Épisodes à répétition, grave</b> : refus

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Phlébite; Thrombose veineuse; Thrombophlébite</b> Inflammation d'une veine, d'un caillot sanguin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Séquelles</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Trouble présent :</b> décision différée <b>Antécédents</b> <b>Épisode isolé, rétablissement complet</b> <b>0 à 1 an :</b> + 50 %, période d'attente de 90 jours <b>Plus de 1 an :</b> standard <b>Épisodes à répétition, anticoagulation chronique :</b> considération individuelle
<b>Pleurésie</b>	Voir Troubles des poumons		
<b>Pneumonie</b>	Voir Troubles des poumons		
<b>Pneumothorax</b>	Voir Troubles des poumons		
<b>Poids insuffisant</b>	Voir le tableau des tailles et poids		
<b>Prolapsus de la valve mitrale (PVM)</b>	Voir Anomalies du cœur		
<b>Psoriasis</b>	Voir Affections cutanées		
<b>Reflux gastro-œsophagien (RGO)</b> Plaintes causées par un reflux du contenu de l'estomac ou du contenu duodénal (acide et bile) dans l'œsophage.		<b>Exigence :</b> DMT	<b>Cause connue :</b> tarification en fonction de la cause <b>Cause inconnue, symptômes légers :</b> standard <b>Cause inconnue, symptômes modérés à graves :</b> exclusion
<b>Sclérose en plaques</b>			<b>Refus</b>
<b>Sclérose latérale amyotrophique (SLA)</b> Maladie de Lou Gehrig Maladie dégénérative du système nerveux.			<b>Refus</b>
<b>Scoliose</b>	Voir Troubles du dos		
<b>Sida – Syndrome d'immunodéficience acquise</b> Y compris les résultats de tests VIH positifs ou incertains. Le VIH amène le sida lorsque le système immunitaire est gravement atteint. Le sida se caractérise par une insuffisance de globules blancs qui rend le sujet vulnérable à une infection opportuniste.			<b>Refus</b> <b>Résultats incertains :</b> révision possible dans 6 mois
<b>Splénectomie</b> Ablation chirurgicale de la rate, habituellement à la suite d'un trauma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radiographie des poumons</li> <li>■ Formule sanguine complète</li> </ul>	<b>À la suite d'une blessure, rétablissement complet, aucune séquelle :</b> standard <b>Autres causes</b> <b>0 à 6 mois :</b> décision différée <b>Après 6 mois :</b> standard
<b>Surdité</b>	Voir Troubles des oreilles		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Syncope</b> Perte de conscience soudaine, dont la durée peut varier, non causée par un trauma ou des convulsions.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Récidives</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Cause connue :</b> tarification en fonction de la cause  <b>Cause inconnue, examen complet, maladies neurologique et cardiaque éliminées</b> <b>0 à 6 mois :</b> décision différée <b>6 mois et plus :</b> standard, période d'attente de 90 jours  <b>Récidives, trouble grave ou examen incomplet :</b> décision différée
<b>Syndrome CREST</b> Trouble chronique du système immunitaire caractérisé par des fibromes diffus de la peau et des organes internes.			<b>Refus</b>
<b>Syndrome de fatigue chronique</b> Fatigue persistante et récidivante qui dure plus de 6 mois et assez grave pour entraîner une réduction d'au moins 50 % des activités quotidiennes, exclusion faite d'autres maladies pouvant être traitées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preuve d'un examen complet qui élimine toute autre maladie ou affection</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Durée de l'absence du travail</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Symptômes présents ou pendant les 5 dernières années :</b> refus  <b>5 ans après le rétablissement :</b> considération individuelle
<b>Syndrome du canal carpien</b> Syndrome résultant de la compression du nerf médian du poignet; il est parfois causé par des mouvements répétitifs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gravité</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>En général :</b> exclusion, possibilité de taux standard un an après la chirurgie, selon les fonctions professionnelles
<b>Tension artérielle élevée</b> Hypertension  L'hypertension artérielle (essentielle) primaire est le type d'HTA le plus courant : elle représente 95 % de tous les cas d'hypertension. Sa cause n'est pas connue, mais on croit qu'elle résulte d'un ensemble complexe de facteurs.  L'hypertension artérielle secondaire résulte d'un trouble rénal, endocrinien ou nerveux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type d'HTA : essentielle ou secondaire</li> <li>■ Âge au début de la maladie</li> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Médicaments/traitement</li> <li>■ Réaction au traitement</li> <li>■ Mesures actuelle et antérieures</li> <li>■ Observance du traitement et suivi</li> <li>■ Troubles reliés</li> <li>■ Taille et poids</li> <li>■ Fumeur ou non-fumeur?</li> </ul>	<b>Exigence :</b> Examen paramédical  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DMT avec mesures antérieures de la tension artérielle</li> <li>■ Précisions sur les examens cardiaques</li> <li>■ Précisions sur les médicaments qui peuvent présenter un facteur de risque</li> <li>■ Mode de vie actif</li> </ul>	<b>Parfaitement contrôlée depuis 1 an, résultats normaux et pas de problème connexe :</b> standard  <b>Autre :</b> considération individuelle
<b>Thalassémie</b> Anémie héréditaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Considération individuelle en fonction du type. DMT requise.</b>
<b>Thrombose veineuse profonde</b>	Voir Phlébite		
<b>Toxicomanie</b>	Voir Abus d'alcool ou de drogues		
<b>Triglycérides : Taux élevé</b>	Voir Cholestérol, Taux élevé		

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Trouble déficitaire de l'attention (TDA)</b> Ce trouble peut être associé avec une plus grande témérité de la part du sujet, des blessures accidentelles résultant d'actions impulsives, de la difficulté à garder son emploi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pas de test définitif</li> <li>■ Traitement par médicaments (stimulants) ainsi que par un changement d'environnement</li> <li>■ Antécédents de troubles anxieux, de dépression ou de personnalité</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT</p>	<p><b>Léger, travail à temps plein, emploi stable :</b> considération individuelle</p> <p><b>Meilleur cas :</b> exclusion</p> <p><b>Autre :</b> refus</p>
<p><b>Troubles affectifs et d'adaptation; Anxiété</b> Variété étendue d'affections qui constituent la principale cause des demandes de prestations d'invalidité. Les affections peuvent être aiguës, récidivantes ou chroniques. Le traitement comprend souvent la consultation et des médicaments.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Date du diagnostic</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Durée du traitement</li> <li>■ Absence du travail</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Antécédents familiaux de maladie psychiatrique</li> <li>■ Symptômes physiques tels que maux de tête, fatigue, douleurs thoraciques, palpitations, essoufflements, maux d'estomac, et douleurs musculaires, articulaires et dorsales</li> <li>■ Causes sous-jacentes telles que abus d'alcool ou de drogues, stress au travail, difficultés financières, etc.</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> Questionnaire sur la santé émotionnelle et DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dates de diagnostic et d'apparition des symptômes</li> <li>■ Facteurs contributifs</li> <li>■ Type de traitement</li> <li>■ Durée du traitement</li> <li>■ Absence du travail</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Antécédents familiaux de maladie psychiatrique</li> <li>■ Nom et titre du praticien qui a été consulté</li> </ul>	<p><b>Troubles d'anxiété</b></p> <p><b>Trouble présent, sous traitement :</b> considération individuelle</p> <p><b>Légers, épisode isolé Remontant à 1 ou 2 ans :</b> exclusion</p> <p><b>Remontant à plus de 2 ans :</b> habituellement standard</p> <p><b>Légers, épisodes à répétition/chroniques :</b> même tarification que pour des troubles modérés</p> <p><b>Modérés, épisode isolé Moins de 1 an :</b> décision différée</p> <p><b>1 an ou plus :</b> exclusion</p> <p><b>Modérés, épisodes à répétition/chroniques :</b> tarification appliquée aux troubles graves</p> <p><b>Graves, épisodes isolé ou à répétition/chroniques :</b> considération individuelle</p>
<p><b>Troubles de l'alimentation : Anorexie mentale; Boulimie mentale</b> Troubles caractérisés par une distorsion de l'image corporelle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge au moment du diagnostic</li> <li>■ Stabilité du poids</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Période écoulée depuis le dernier épisode</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur la santé émotionnelle</p>	<p><b>Dépression réactionnelle légère</b></p> <p><b>Trouble présent :</b> refus</p> <p><b>Épisode isolé, rétablissement complet, aucun traitement, aucune absence du travail 1 à 3 ans :</b> exclusion</p> <p><b>Plus de 3 ans :</b> possibilité de taux standard</p> <p><b>Dépression majeure : Trouble affectif bipolaire</b></p> <p><b>Trouble présent ou au cours des 5 dernières années :</b> refus</p> <p><b>Après 5 ans : épisode isolé, rétablissement complet, emploi stable :</b> considération individuelle</p>
<p><b>Troubles de l'alimentation : Anorexie mentale; Boulimie mentale</b> Troubles caractérisés par une distorsion de l'image corporelle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge au moment du diagnostic</li> <li>■ Stabilité du poids</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Période écoulée depuis le dernier épisode</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur la santé émotionnelle</p>	<p><b>Au moins 5 ans après le dernier épisode</b></p> <p><b>Meilleur cas :</b> surprime, réduction de la durée des prestations et exclusion pour troubles psychiatriques</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Troubles de l'estomac : Gastrite</b> Inflammation de l'estomac.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aiguë</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Cause</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Aiguë, crise isolée :</b> standard, période d'attente de 90 jours  <b>Chronique ou à répétition, cause inconnue</b> <b>0 à 2 ans :</b> exclusion <b>2 ans et plus :</b> standard
<b>Troubles de l'estomac : Indigestion</b> Dyspepsie, estomac acide, hyperacidité  Troubles digestifs fonctionnels, habituellement contrôlés par une diète et des médicaments.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aiguë</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Cause</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Aiguë, crise isolée :</b> standard  <b>Chronique ou à répétition, cause inconnue</b> <b>0 à 2 ans :</b> exclusion <b>2 ans et plus :</b> standard
<b>Troubles de l'estomac : Ulcère</b> Gastroduodénal, duodénal, gastrique, etc.  L'ulcère gastroduodénal est une affection commune caractérisée par des ulcérations dans l'œsophage, l'estomac ou le duodénum. La maladie était autrefois attribuée à la sécrétion d'acides dans l'estomac. Même si cette sécrétion est un facteur dans la formation d'ulcères, on pense maintenant que la bactérie <i>H. pylori</i> est la principale cause de la maladie. Les antibiotiques constituent un traitement efficace et empêchent la récurrence. Les ulcères sont aussi causés par la prise chronique d'anti-inflammatoires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Complications</li> <li>■ Fumeur ou non-fumeur?</li> <li>■ Symptômes</li> <li>■ Récidives</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protocole opératoire</li> <li>■ Tests du transit oeso-gastro-duodénal</li> </ul>	<b>Le proposant n'a pas été opéré, sous traitement, pas de saignement ni absence du travail</b> <b>Trouble présent :</b> exclusion <b>Antécédents, dans les 2 années précédentes :</b> exclusion  <b>Autre :</b> considération individuelle
<b>Troubles de la prostate : Hypertrophie</b> Glande entourant le col de la vessie et l'urètre chez l'homme. Les troubles peuvent comprendre l'inflammation (aiguë ou chronique), l'hypertrophie ou le cancer de la prostate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Étendue</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Urine normale</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapport de pathologie, s'il y a lieu</li> <li>■ Analyse d'urine</li> </ul>	<b>Trouble présent, aucun symptôme, aucune tumeur maligne, APS normal :</b> standard, période d'attente de 90 jours  <b>Autre :</b> considération individuelle : exclusion jusqu'à décision différée
<b>Troubles de la prostate : Prostatite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récidives</li> <li>■ Analyse d'urine</li> <li>■ Absence d'hématurie</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT  <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analyse d'urine si le trouble est apparu durant la dernière année</li> </ul>	<b>Épisode isolé, rétablissement complet :</b> habituellement standard  <b>Chronique :</b> exclusion
<b>Troubles de la thyroïde : Hyperthyroïdie</b> Glande hyperactive sécrétant une hormone qui agit sur le métabolisme du corps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Traitement</li> <li>■ Contrôle</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Trouble présent, non encore contrôlé :</b> refus  <b>Antécédents, proposant opéré ou traité, sous contrôle</b> <b>0 à 6 mois :</b> exclusion, période d'attente de 90 jours <b>Plus de 6 mois :</b> standard  <b>Non contrôlée :</b> refus

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Troubles de la thyroïde : Hypothyroïdie</b> Insuffisance d'activité de la glande thyroïde qui sécrète une hormone agissant sur le métabolisme du corps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Traitement</li> <li>■ Contrôle</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapports de laboratoire</li> </ul>	<b>Traitée, contrôlée :</b> habituellement standard <b>Non contrôlée :</b> considération individuelle
<b>Troubles de la thyroïde : Maladie de Graves</b> Hyperactivité de la thyroïde qui provoque le développement d'un goitre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Traitement</li> <li>■ Contrôle</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Contrôlée, depuis moins de 2 ans :</b> surprime ou exclusion <b>Contrôlée depuis 2 ans ou plus :</b> habituellement standard
<b>Troubles de la thyroïde : Nodules thyroïdiens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapport de pathologie</li> <li>■ Échographie</li> </ul>	<b>Trouble présent, examen complet, bénin, asymptomatique :</b> standard jusqu'à l'exclusion <b>Pas d'examen :</b> décision différée
<b>Troubles des genoux</b> Le genou est une articulation importante et complexe qui supporte le poids du corps. Il est susceptible de subir des blessures. Les entorses sont très fréquentes. Les blessures de ligaments et les déchirures du ménisque sont plus graves.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Type</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Rétablissement</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Épisode isolé, court arrêt de travail, pas de lésion des cartilages et ligaments :</b> habituellement standard avec période d'attente de 90 jours, selon les fonctions professionnelles <b>Épisodes à répétition, arrêt de travail, ou lésion des cartilages et ligaments :</b> exclusion, selon les fonctions professionnelles <b>Chirurgie remontant à moins d'un an :</b> exclusion, selon les fonctions professionnelles <b>Chirurgie remontant à plus d'un an :</b> habituellement standard, selon les fonctions professionnelles
<b>Troubles des intestins : Colite infectieuse</b> Inflammation du côlon (intestin) causée par une infestation bactérienne du tractus gastro-intestinal – habituellement de courte durée et accompagnée de fièvre, crampes et diarrhée. Il est important de prendre en note le diagnostic exact, l'étendue du côlon affectée, la gravité, le traitement et le degré de progression.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Durée</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Âge lors de la première crise</li> <li>■ Perte de poids</li> <li>■ Symptômes psychologiques</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Aiguë, rétablissement :</b> standard <b>Crises répétées ou graves</b> <b>0 à 1 an :</b> + 25 à 50 %, période d'attente de 90 jours <b>Plus d'un an :</b> standard avec période d'attente de 90 jours

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Troubles des intestins : Colite ulcéreuse</b> Inflammation chronique du côlon (intestin) dont la cause est inconnue. Parmi les symptômes, notons la diarrhée sanglante. Évolution avec rémissions et exacerbations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gravité</li> <li>■ Durée</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Âge lors de la première crise</li> <li>■ Perte de poids</li> <li>■ Épisodes multiples menant à un risque accru de polypes</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rapports de coloscopie</li> </ul>	<p><b>Épisode isolé au cours des 2 dernières années :</b> refus</p> <p><b>Remonte à plus de 2 ans, légère, sans opération, sans complication, poids moins de 15 % inférieur à la normale :</b> exclusion</p> <p><b>Plusieurs récidives au cours des 5 années précédentes :</b> refus</p> <p><b>Après 5 ans ou modérée :</b> surprime, exclusion et réduction de la durée des prestations</p> <p><b>Opération suivie d'un rétablissement complet, poids normal maintenu et aucun signe de tumeur maligne</b></p> <p><b>Dans les 6 mois suivants :</b> décision différée</p> <p><b>Après 6 mois :</b> possibilité de taux standard</p>
<p><b>Troubles des intestins : Côlon irritable; Colite spastique</b> Inflammation du côlon (intestin) souvent associée à l'anxiété. Les symptômes comprennent une douleur abdominale intermittente, la constipation et la diarrhée. Il est important de prendre en note le diagnostic exact, l'étendue du côlon affectée, la gravité, le traitement et le degré de progression.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Gravité</li> <li>■ Durée</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Âge lors de la première crise</li> <li>■ Perte de poids</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Trouble présent et pendant la première année :</b> exclusion</p> <p><b>Antécédents, remonte à plus d'un an, épisode isolé :</b> habituellement standard</p> <p><b>Crises à répétition, chroniques ou modérées :</b> exclusion, plus surprime de + 50 %</p>
<p><b>Troubles des oreilles : Maladie de Ménière</b> Maladie causée par un trauma, une infection et des maladies plus graves comme la sclérose en plaques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Symptômes : type et gravité</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Comorbidités</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Dans les 2 ans suivant l'apparition des symptômes :</b> décision différée</p> <p><b>Après 2 ans, symptômes légers :</b> surprime de + 25 à 50 %</p>
<p><b>Troubles des oreilles : Mastoïdite</b> Inflammation du mastoïde – aiguë ou à répétition.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récidives</li> <li>■ Perte de l'ouïe</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT si dans les 2 années suivant l'apparition des symptômes</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Résultats de l'audiométrie</li> </ul>	<p><b>Trouble présent :</b> décision différée</p> <p><b>Épisode isolé, rétablissement complet, aucune perte résiduelle de l'ouïe :</b> standard</p> <p><b>Récidives ou perte de l'ouïe :</b> même tarification que pour la perte de l'ouïe</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Troubles des oreilles : Surdit�; Perte de l'ou�e</b> Perte totale ou partielle de l'ou�e par suite d'un trauma ou d'une maladie. Elle peut �tre progressive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ �tendue</li> <li>■ Cons�quences sur les fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'acc�l�rer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ R�sultats de l'audiom�trie</li> </ul>	<p><b>Non progressive</b> <b>Perte de l'ou�e d'une oreille : autre oreille normale, aucune cons�quence sur les fonctions professionnelles :</b> habituellement standard avec p�riode d'attente de 90 jours <b>Perte moyenne jusqu'� totale de l'ou�e des deux oreilles :</b> surprime ou exclusion</p> <p><b>Perte de l'ou�e progressive ou caus�e par une exposition prolong�e au bruit :</b> exclusion, plus surprime de + 25 � 50 %</p> <p><b>En cas d'exclusion, la perte de l'ou�e des deux oreilles sera �limin�e des dispositions du contrat touchant l'invalidit� pr�sum�e</b></p>
<p><b>Troubles des poumons : Emphys�me; Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)</b> Obstruction des voies respiratoires souvent associ�e � des ant�c�dents de tabagisme..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Gravit�</li> <li>■ Fumeur ou non-fumeur?</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>L�ger � mod�r�, proposant Non-fumeur :</b> + 25 � 50 % <b>Fumeur :</b> + 75 %, dur�e des prestations de 5 ans <b>Grave :</b> refus</p>
<p><b>Troubles des poumons : Pleur�sie</b> Inflammation de la membrane tapissant l'int�rieur de la paroi thoracique et la surface des poumons. Elle peut �tre reli�e � une infection pulmonaire aigu� (p. ex., pneumonie ou grippe) ou � des maladies plus graves (insuffisance cardiaque, tumeurs malignes, pancr�atite, etc.).  L'�panchement s'entend accumulation de fluide dans laavit� pleurale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Crise isol�e?</li> <li>■ R�cidives</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'acc�l�rer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radiographie des poumons</li> </ul>	<p><b>Pleur�sie s�che</b> <b>Cause inconnue, crise isol�e</b> <b>Dans les 6 mois :</b> d�cision diff�r�e <b>Apr�s 6 mois :</b> standard <b>Autre :</b> consid�ration individuelle</p>
<p><b>Troubles des poumons : Pneumonie</b> Infection pulmonaire aigu� caus�e par des bact�ries, virus ou champignons.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ R�cidives</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'acc�l�rer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radiographie des poumons</li> <li>■ Tests de fonction pulmonaire</li> </ul>	<p><b>Trouble pr�sent :</b> d�cision diff�r�e <b>�pisode isol�, r�tablissement complet :</b> standard <b>Plus de 2 �pisodes en 12 mois :</b> refus</p>
<p><b>Troubles des poumons : Pneumonite</b> Maladie des poumons qui fait suite � une inhalation de min�raux ou de poussiti�e organique.</p>			<p>Refus</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Troubles des poumons : Pneumothorax</b> Effondrement d'un poumon, parfois spontané, pouvant résulter d'un trauma ou avoir été causé artificiellement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Rétablissement complet</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radiographie des poumons</li> </ul>	<p><b>Trouble présent :</b> décision différée</p> <p><b>Sans opération, trouble traumatique, rétablissement :</b> standard</p> <p><b>Spontané, aucun signe de maladie sous-jacente, 1 ou 2 crises, rétablissement après 3 mois :</b> standard</p> <p><b>Plus de 2 crises :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0 à 6 mois :</b> décision différée</li> <li><b>Après 6 mois :</b> standard avec période d'attente de 90 jours</li> </ul>
<p><b>Troubles des poumons : Tuberculose</b> Maladie infectieuse qui se répand au Canada en raison de l'immigration et de l'exposition au VIH. Elle est généralement contrôlable par un traitement médical approprié, bien que des souches pharmacorésistantes soient apparues. Il est important de prendre en note le nombre de sites et la gravité de l'infection, les médicaments, la progression et les complications éventuelles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Étendue de la maladie</li> <li>■ Complications</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Radiographie des poumons</li> <li>■ Examens pulmonaires</li> </ul>	<p><b>Trouble présent :</b> refus</p> <p><b>Infection pulmonaire, traitée et suivie d'un rétablissement complet, sans trouble résiduel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Légère :</b> standard</li> <li><b>Moderée :</b> standard jusqu'à + 50 %</li> </ul> <p><b>Autre :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)</p>
<p><b>Troubles des reins : Calcul néphrétique</b> Calcul rénal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un seul rein ou les deux reins?</li> <li>■ Épisodes isolé ou à répétition?</li> <li>■ Tests de fonction rénale normaux</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analyse d'urine</li> </ul>	<p><b>Fonction rénale normale, analyse d'urine, tension artérielle, aucun autre problème relatif aux reins</b></p> <p><b>Trouble présent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Un rein :</b> exclusion, période d'attente de 90 jours</li> <li><b>Les deux reins :</b> refus</li> </ul> <p><b>Calcul « passé » ou enlevé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 ou 2 épisodes :</b> standard avec période d'attente de 90 jours</li> <li><b>2 épisodes et plus :</b> exclusion ou surprime de 25 %</li> </ul>
<p><b>Troubles des reins : Glomérulonéphrite</b> Y compris maladie de Bright.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aiguë</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Chronique</li> <li>■ Stabilité</li> <li>■ Tension artérielle normale</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Considération individuelle (proposition à l'essai)</b></p> <p><b>Meilleur cas : un épisode aigu il y a plus de 5 ans, aucune séquelle, analyses d'urine, de fonction rénale et de tension artérielle normales :</b> standard</p> <p><b>Autre :</b> considération individuelle</p>
<p><b>Troubles des reins : Greffe de rein</b></p>		<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Receveur :</b> refus</p> <p><b>Donneur :</b> voir Néphrectomie</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Troubles des reins : Insuffisance rénale</b> Détérioration de la fonction rénale – peut être aiguë par suite d'un choc, de lésion par écrasement, d'infection ou d'empoisonnement. Le rétablissement peut être complet ou la maladie peut devenir chronique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Rétablissement complet</li> <li>■ Épisode isolé</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analyse d'urine</li> <li>■ Tests de fonction rénale</li> </ul>	<b>Épisode aigu, rétablissement complet, analyse d'urine normale, tension artérielle normale</b> <b>Dans l'année :</b> décision différée <b>1 à 2 ans :</b> tarification en fonction de la cause plus surprime de + 50 % <b>Plus de 2 ans :</b> tarification en fonction de la cause <b>Autre :</b> refus
<b>Troubles des reins : Maladie polykystique des reins</b> Maladie héréditaire caractérisée par la production graduelle de kystes multiples qui, éventuellement, détruisent les tissus rénaux normaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antécédents familiaux</li> <li>■ Examen approfondi</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Résultat négatif de l'échographie</li> </ul>	<b>Refus</b> <b>Antécédents familiaux de maladie polykystique des reins</b> <b>Aucun examen :</b> refus <b>Avec examen :</b> considération individuelle
<b>Troubles des reins : Néphrectomie</b> Ablation chirurgicale d'un rein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ État de l'autre rein</li> <li>■ Aucune déficience de l'appareil urinaire</li> <li>■ Pas d'hypertension artérielle</li> <li>■ Non causée par une tumeur maligne</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT <b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analyse d'urine</li> <li>■ Protocole opératoire</li> </ul>	<b>Causée par une anomalie congénitale, un trauma, une tumeur bénigne, un kyste; rein non touché normal; analyse d'urine normale; aucune récurrence de déficience de l'appareil urinaire ou d'hypertension artérielle</b> <b>0 à 6 mois :</b> décision différée <b>Après 6 mois :</b> standard avec période d'attente de 90 jours <b>Autre :</b> considération individuelle
<b>Troubles des tissus conjonctifs : Lupus discoïde</b> Lésions cutanées aggravées par une exposition au soleil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Précisions sur l'exposition au soleil</li> <li>■ Traitement</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Dans l'année :</b> décision différée <b>Antécédents, diagnostic formel, aucune preuve de présence de lupus érythémateux disséminé, après un an :</b> exclusion et période d'attente minimum de 90 jours
<b>Troubles des tissus conjonctifs : Lupus érythémateux disséminé (LED)</b> Maladie rhumatismale touchant plusieurs organes.			<b>Refus</b>
<b>Troubles des yeux : Cataracte</b> Opacification de la lentille de l'œil. La forme la plus fréquente est la cataracte sénile. D'autres formes peuvent être causées par un trauma ou par des complications liées au diabète ou à d'autres problèmes d'ordre médical.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<b>Exigence :</b> DMT	<b>Sans opération</b> <b>Forme sénile, acuité visuelle d'au moins 20/100 :</b> exclusion et surprime de + 25 % <b>Forme traumatique :</b> exclusion et surprime de 25 % <b>Autre :</b> considération individuelle <b>Proposant opéré, rétablissement complet</b> <b>Aucune déficience visuelle :</b> standard <b>Autre :</b> surprime pour déficience visuelle <b>La perte de la vue des deux yeux peut être éliminée des dispositions du contrat touchant l'invalidité présumée</b>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Troubles des yeux : Cécité; Déficience visuelle</b> La perte de la vision peut être causée par un trauma ou par une maladie et peut être aiguë ou progressive.</p> <p>La cécité légale est de 20/200 ou moins dans l'œil ayant la <i>meilleure</i> vision.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Étendue</li> <li>■ Les deux yeux sont-ils atteints?</li> <li>■ Conséquences sur les fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Causée par un trauma :</b> surprime</p> <p><b>Autres causes :</b> considération individuelle</p> <p><b>Déficience visuelle avec correction</b> <b>Cécité totale :</b> refus <b>Autre :</b> considération individuelle selon le degré de perte de la vue des deux yeux</p> <p><b>La perte de la vue des deux yeux peut être éliminée des dispositions du contrat touchant l'invalidité présumée</b></p>
<p><b>Troubles des yeux : Décollement de la rétine</b> Séparation partielle ou totale entre le feuillet interne de la rétine et le feuillet pigmenté rétinien, qui exige un traitement d'urgence.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Perte de la vision</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Sans opération :</b> exclusion</p> <p><b>Un an ou moins après l'opération :</b> exclusion</p> <p><b>Plus d'un an après l'opération :</b> même tarification que pour une perte de la vision</p>
<p><b>Troubles des yeux : Glaucome</b> Augmentation de la pression intraoculaire.</p> <p>Peut être aiguë ou chronique. Un glaucome chronique non traité correctement peut entraîner la détérioration du nerf optique ou une déficience visuelle. Il peut s'agir d'un glaucome primaire ou secondaire à un trauma ou à d'autres troubles des yeux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Perte de la vision</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Trouble présent :</b> exclusion</p> <p><b>Après chirurgie correctrice</b> <b>12 premiers mois :</b> exclusion <b>Après un an, rémission complète, aucune complication, vision normale complète :</b> standard</p> <p><b>La perte de la vue des deux yeux peut être éliminée des dispositions du contrat touchant l'invalidité présumée</b></p>
<p><b>Troubles des yeux : Iritis</b> Inflammation de l'iris.</p> <p>Aiguë ou chronique, elle peut être causée par une infection ou être associée à des affections sous-jacentes. Une infection grave peut entraîner la perte de la vision.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cause</li> <li>■ Récidives</li> <li>■ Rétablissement</li> <li>■ Perte de la vision</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p>	<p><b>Cause connue :</b> tarification en fonction de la cause</p> <p><b>Cause inconnue</b> <b>Épisode isolé, proposant rétabli depuis au moins 6 mois :</b> exclusion <b>Épisode isolé, proposant rétabli depuis au moins 3 ans :</b> même tarification que pour une perte de la vision <b>Épisodes à répétition :</b> considération individuelle (proposition à l'essai)</p>
<p><b>Troubles du dos : Déviation de la colonne vertébrale</b> Déviation anormale découlant de diverses maladies musculo-squelettiques ou de traumas.</p> <p>Lordose : incurvation à convexité antérieure (« dos concave »)</p> <p>Cyphose : incurvation à convexité postérieure (« bosse au dos »)</p> <p>Scoliose : incurvation latérale qui peut être présente avec l'une ou l'autre des affections ci-dessus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Degré de la déviation</li> <li>■ Absence de complications respiratoires</li> <li>■ Répercussions sur la démarche</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur les maux de dos</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b> ■ Copie de toute radiographie</p>	<p><b>Sans opération</b> <b>Légère :</b> habituellement standard <b>Modérée :</b> considération individuelle <b>Grave :</b> refus</p> <p><b>Proposant opéré et rétabli complètement</b> <b>0 à 1 an :</b> refus <b>Plus de 1 an :</b> exclusion</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Troubles du dos : Hernie discale, disque hernié ou « disque rompu »</b>            Protrusion de la matière du disque entre les vertèbres, entraînant l'irritation des racines nerveuses.</p> <p>Elle résulte d'un trauma ou d'un processus de dégénérescence.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opération?</li> <li>Épisodes isolés ou à répétition?</li> <li>Continue la thérapie</li> <li>Fonctions professionnelles physiquement exigeantes</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> DMT, Questionnaire sur les maux de dos</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copie de toute radiographie</li> </ul>	<p><b>Avec ou sans opération :</b> exclusion et/ou surprime basées sur la période écoulée depuis le dernier épisode</p> <p><b>Asymptomatique depuis plus de 5 ans :</b> possiblement standard</p>
<p><b>Troubles du dos : Vertèbres fracturées</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cause de la fracture</li> <li>Rétablissement complet</li> <li>Durée de l'absence du travail</li> <li>Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT, Questionnaire sur les maux de dos</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copie de toute radiographie</li> </ul>	<p><b>Par suite d'un trauma, rétablissement complet, selon la profession et la durée de l'absence du travail :</b> exclusion</p> <p><b>Par suite d'ostéoporose :</b> refus</p>
<b>Tuberculose</b>	Voir Troubles des poumons		
<b>Tumeurs</b>	Voir Tumeurs de la peau ou Cancer		
<p><b>Tumeurs de la peau : Bénignes et sans mélanome; Mélanome</b></p> <p><b>Tumeurs sans mélanome les plus fréquentes :</b> Carcinome basocellulaire et épithélioma spinocellulaire. Ces tumeurs se propagent rarement.</p> <p><b>Mélanome :</b> Souvent caractérisées par un changement dans la taille, la forme ou la couleur. Plus rares, mais plus virulentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type</li> <li>Antécédents familiaux de mélanome</li> <li>Grains de beauté atypiques (dysplasiques)</li> <li>Date du diagnostic</li> <li>Pathologie</li> <li>Type de traitement</li> <li>Confirmation que la tumeur a été enlevée complètement</li> <li>Récidives</li> <li>Stade</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> DMT</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport de pathologie avec stade</li> <li>Précisions sur le suivi</li> </ul>	<p><b>Bénignes :</b></p> <p><b>Nævus dysplasique (aucun antécédent familial de mélanome ou de syndrome du nævus dysplasique) Présence d'un nævus dysplasique :</b> exclusion</p> <p><b>Nævus dysplasique retiré, aucun autre grain de beauté inhabituel ou atypique, avec suivi annuel :</b> standard</p> <p><b>Autrement :</b> exclusion</p> <p><b>Syndrome du nævus dysplasique ou antécédents familiaux de ce syndrome ou de mélanome :</b> refus</p> <p><b>Sans mélanome :</b></p> <p><b>Excision complète et suivi :</b></p> <p><b>0 à 1 an :</b> décision différée ou exclusion</p> <p><b>Après 1 an :</b> standard</p> <p><b>Avec mélanome :</b> habituellement refus</p>
<b>Ulcère</b>	Voir Troubles de l'estomac		
<p><b>Usage de drogues : Drogues non prescrites, narcotiques</b>            Cocaïne, ecstasy, LSD, héroïne, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quand?</li> <li>Consommation la plus récente</li> <li>Quantité</li> <li>Plusieurs drogues?</li> <li>Preuve de stabilités professionnelle et financière</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur l'usage de drogues</p>	<p><b>Usage présent :</b> refus</p> <p><b>Aucune consommation pendant au moins les 5 dernières années, par ailleurs risque favorable</b></p> <p><b>Meilleur cas :</b> surprime et réduction de la durée des prestations</p>
<p><b>Usage de drogues : Marijuana</b>            Cannabis, hachisch, pot</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Âge</li> <li>Fréquence</li> <li>Stabilité d'emploi et stabilité financière</li> <li>Dossier de conduite automobile</li> <li>Aucune autre plainte</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur l'usage de drogues</p>	<p><b>Taux non-fumeurs si le proposant n'a fait usage d'aucun autre type de tabac</b></p> <p><b>Selon de l'usage et d'autres facteurs ayant trait au mode de vie :</b> standard jusqu'au refus</p>

Affection et description	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Varices : Jambes</b> Veines anormalement dilatées, caractérisées par un fonctionnement insuffisant des valvules. Elles peuvent résulter d'un trouble bénin (obésité, grossesse, stations debout fréquentes) ou grave (cirrhose, tumeurs, caillots, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Endroit</li> <li>■ Cause</li> <li>■ Traitement</li> <li>■ Complications</li> <li>■ Fonctions professionnelles</li> </ul>	<p><b>Exigence : DMT</b></p>	<p><b>Trouble présent, pas d'ulcère ni de tuméfaction, non invalidantes</b>  <b>Légères, le proposant ne porte pas de bas de soutien</b> : standard, période d'attente de 90 jours  <b>Modérées à graves, le proposant porte des bas de soutien</b> : exclusion, période d'attente de 90 jours</p> <p><b>Proposant opéré, rétablissement complet</b>  <b>0 à 6 mois</b> : exclusion, période d'attente de 90 jours  <b>6 mois et plus</b> : habituellement standard</p>
<p><b>Vertige</b></p>	<p>Voir Étourdissements</p>		
<p><b>Zona</b> Herpès zoster Infection des nerfs avec éruption cutanée.</p>		<p><b>Exigence : DMT</b></p>	<p><b>Rétablissement complet, aucune douleur résiduelle ni signe de perte d'immunité</b> : standard</p>

# Risques non médicaux

Activité	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<p><b>Aviation – Privée</b> Pilotes qui détiennent une licence privée (qu'ils aient la certification IFR ou non) et qui volent à des fins récréatives ou commerciales. Dans cette catégorie, l'aviation d'affaires renvoie aux pilotes non professionnels (non rémunérés) qui volent à des fins commerciales non reliées à l'aviation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Expérience et qualifications comme pilote</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> <li>■ Destinations des vols</li> <li>■ Type d'appareil</li> <li>■ Type de vol</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur l'aviation</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Heures de vol par année</li> <li>■ Qualifications</li> <li>■ Appareil</li> <li>■ Précisions sur les vols spécialisés</li> </ul>	<p><b>Le proposant a obtenu sa licence au moins un an avant de présenter la proposition, minimum de 75 heures en solo, fait de 25 à 200 heures de vol par année, ne décolle pas sur l'eau ni n'amerrit :</b> standard</p> <p><b>Autre :</b> exclusion</p>
<p><b>Aviation – Sport</b> Cette catégorie couvre un certain nombre d'activités récréatives, notamment l'utilisation d'un appareil non conventionnel et les compétitions ou spectacles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Expérience et qualifications comme pilote</li> <li>■ Amateur ou professionnel</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> <li>■ Destinations des vols</li> <li>■ Type d'appareil piloté</li> <li>■ Type de vol</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur le vol en ballon, en deltaplane et en avion ultraléger</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Heures de vol par année</li> <li>■ Qualifications</li> <li>■ Appareil</li> <li>■ Précisions sur les vols spécialisés</li> </ul>	<p><b>Vol en ballon, deltaplane et parapente :</b> exclusion</p>
<p><b>Conduite</b> Les accidents d'automobile sont la première cause de décès chez les jeunes. L'alcool et la vitesse excessive comptent parmi les facteurs contribuant aux accidents mortels. Chez les personnes âgées (&gt; 65 ans), ils peuvent être des signes de dégénérescence cognitive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Types d'infractions</li> <li>■ Fréquence des infractions</li> <li>■ Conduite avec facultés affaiblies (infractions multiples)</li> <li>■ Suspensions et nombre de suspensions</li> <li>■ Accident (avec responsabilité)</li> <li>■ Activités extraprofessionnelles risquées</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> RBVA</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nombre et types d'infractions</li> <li>■ Date de la dernière infraction</li> <li>■ Date, durée et raison de la dernière suspension du permis</li> </ul>	<p><b>Plusieurs infractions mineures :</b> standard</p> <p><b>Plusieurs infractions modérées :</b> taux de + 25 à 50 %</p> <p><b>Plusieurs infractions graves :</b> taux de + 75 à 100 % et période de prestation réduite, jusqu'au refus</p> <p>Dans le cas de la <b>conduite avec facultés affaiblies</b>, il est impossible d'évaluer la demande avant qu'une période d'au moins 6 mois se soit écoulée depuis la fin de la suspension, ou d'au moins 12 mois s'il y a d'autres infractions</p>
<p><b>Course automobile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Type de véhicule/taille du moteur</li> <li>■ Type de carburant</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Vitesses atteintes (vitesses moyenne et maximale)</li> <li>■ Type de parcours</li> <li>■ Lieux (hors du Canada ou des É.-U.)</li> <li>■ Activités extraprofessionnelles connexes</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur la course automobile</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de parcours et fréquence</li> <li>■ Vitesses atteintes</li> </ul>	<p><b>Exclusion</b></p>

Activité	Facteurs influant sur la décision	Tarifification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Escalade – Falaise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Hauteur</li> <li>■ Lieu : localement ou ailleurs</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur l'alpinisme</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain</li> </ul>	<b>Standard jusqu'à l'exclusion</b>
<b>Escalade – Glace ou neige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain : pistes établies</li> <li>■ Altitude</li> <li>■ Lieu : Amérique du Nord/Europe ou ailleurs</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> Questionnaire sur l'alpinisme, Questionnaire sur les voyages à l'étranger (s'il y a lieu)</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain</li> </ul>	<p><b>Escalade dans les montagnes de l'Himalaya :</b> pas assurable</p> <p><b>Autre :</b> standard jusqu'à l'exclusion</p>
<b>Escalade – Montagne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type of terrain : pistes établies</li> <li>■ Altitude</li> <li>■ Lieu : Amérique du Nord/Europe ou ailleurs</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> Questionnaire sur l'alpinisme, Questionnaire sur les voyages à l'étranger (s'il y a lieu)</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain</li> </ul>	<b>Standard jusqu'à l'exclusion</b>
<b>Escalade – Rocher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Hauteur</li> <li>■ En salle seulement</li> <li>■ Lieu (escalade en plein air) : Amérique du Nord/Europe ou ailleurs</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> Questionnaire sur l'alpinisme, Questionnaire sur les voyages à l'étranger (s'il y a lieu)</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ En salle ou en plein air</li> <li>■ Degré de difficulté</li> </ul>	<b>Standard jusqu'à l'exclusion</b>
<b>Escalade – Trekking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain : pistes établies</li> <li>■ Altitude</li> <li>■ Lieu : Amérique du Nord/Europe ou ailleurs</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> </ul>	<p><b>Exigences :</b> Questionnaire sur l'alpinisme, Questionnaire sur les voyages à l'étranger (s'il y a lieu)</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expérience globale</li> <li>■ Fréquence</li> <li>■ Type de terrain</li> </ul>	<b>Généralement, taux standard</b>

Activité	Facteurs influant sur la décision	Tarification accélérée	Décision probable du tarificateur
<b>Plongée sous-marine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Âge actuel</li> <li>■ Expérience et niveau de certification</li> <li>■ Profondeur et fréquence des plongées</li> <li>■ Antécédents médicaux</li> <li>■ Mode de vie</li> <li>■ Endroit (p. ex., lac, océan, plage)</li> <li>■ Site de plongée (p. ex., épaves, récupération)</li> <li>■ Activités (p. ex., recherche et sauvetage, grottes, sous la glace)</li> <li>■ Plongée commerciale</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur la plongée sous-marine</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de plongée (endroit, site, activités)</li> <li>■ Expérience</li> <li>■ Fréquence</li> </ul>	<p>Généralement, taux standard si le proposant a reçu une certification, s'il ne fait pas de plongée avec décompression et s'il ne fait aucune plongée dans des grottes, sous la glace ou de sauvetage</p>
<b>Voyages à l'étranger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pays visités et destination à l'intérieur de ces pays</li> <li>■ Fréquence et durée des visites (nombre total de jours par année dans chaque pays)</li> <li>■ But des voyages</li> <li>■ Âge du proposant</li> <li>■ État de santé du proposant</li> <li>■ Avertissements ou avis aux voyageurs et avis publics émis par le gouvernement du Canada</li> <li>■ Citoyen canadien ou résident permanent</li> </ul>	<p><b>Exigence :</b> Questionnaire sur les voyages à l'étranger</p> <p><b>Renseignements permettant d'accélérer le processus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il faut soumettre un questionnaire sur les voyages indiquant les destinations, la fréquence et la durée des visites avec les documents initiaux</li> </ul>	<p>Ne pas soumettre de proposition si un voyage est planifié ou prévu dans les 30 prochains jours; le cas échéant, attendre jusqu'à ce que le proposant soit de retour</p> <p><b>Meilleur des cas :</b> standard selon le pays visité pendant moins de 8 semaines cumulatives par année</p> <p><b>Cas typique :</b> exclusion, indiquant le retour du client au Canada ou aux États-Unis pour que la demande de règlement soit prise en considération. Si le proposant voyage dans des pays à risque plus élevé, nous pouvons ajouter une exclusion additionnelle pour toute invalidité survenant dans un pays donné</p> <p><b>Pire des cas :</b> refus</p>

# Statut de fumeur – définition

## Taux fumeurs

Votre client devra payer les taux fumeurs s'il fait usage d'un produit du tabac tel que les cigarettes, le cigare, la pipe, le tabac à chiquer et la gomme ou les timbres à la nicotine.

## Taux non-fumeurs

Votre client payera les taux non-fumeurs s'il n'a fait usage d'aucun type de tabac ou de produits à base de nicotine au cours des 12 derniers mois.

Une personne qui fume occasionnellement le cigare peut être considérée comme un non-fumeur :

- si elle fume 12 cigares ou moins par année, et
- si elle donne toutes les précisions à cet égard dans la proposition, et
- si les résultats de l'examen d'urine ne révèlent aucune trace de cotinine, et
- si elle n'est pas considérée comme un risque aggravé en raison d'une déficience liée à l'usage du tabac.

# Taille et poids – adultes

Le tableau ci-dessous indique les normes habituelles relatives au rapport taille-poids.

Hommes et femmes âgés de 18 ans et plus			
Taille	Poids (lb)	Taille	Poids (lb)
4'8"	76–140	5'9"	115–212
4'9"	79–145	5'10"	119–219
4'10"	81–150	5'11"	122–224
4'11"	85–156	6'0"	126–232
5'0"	87–160	6'1"	129–237
5'1"	91–166	6'2"	133–245
5'2"	93–171	6'3"	137–253
5'3"	96–177	6'4"	140–258
5'4"	100–184	6'5"	144–266
5'5"	102–189	6'6"	147–272
5'6"	106–195	6'7"	152–280
5'7"	109–200	6'8"	155–286
5'8"	113–207	6'9"	159–234



Les noms Manuvie et Assurance Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.