

GUIDE DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE INDIVIDUELLE

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



assurances vie et maladie complémentaire

À PROPOS D'ASSURANCE VIE ÉQUITABLE DU CANADA^{MD}



L'Assurance vie Équitable^{MD} est fière de compter parmi les compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada. Nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat et non d'actionnaires. Cela nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité.

Nous veillons à respecter nos engagements envers nos clients, c'est-à-dire leur offrir une valeur sûre et satisfaire leurs besoins en matière de protection d'assurance et d'accumulation de patrimoine, maintenant et pour les années à venir. Voilà pourquoi, depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux.

L'Assurance vie Équitable est une compagnie stable et solide et sait maintenir son cap. Nous détenons des revenus et des capitaux suffisants pour atteindre nos objectifs de croissance futurs et notre croissance évolue constamment. Notre croissance au chapitre des ventes a été influencée par notre capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique, en accordant la priorité à nos produits, à notre service et à notre exécution. Notre succès financier est le fruit de notre engagement continu visant une croissance rentable et de notre capacité d'évoluer dans un cadre de réglementation et un contexte économique évolutifs.

Le principe de la mutualité est un élément clé de notre proposition de valeur, de concert avec notre portefeuille de produits diversifié et notre service de premier ordre. Nous sommes une entreprise progressive, concurrentielle et fermement engagée à servir les intérêts de nos titulaires de contrat en leur offrant des stratégies à long terme qui favorisent la stabilité, la croissance et la rentabilité.

À PROPOS DE CE GUIDE

Le présent guide vous donne un aperçu sur la façon dont les risques médicaux et les risques non médicaux influencent la tarification des produits d'assurance individuelle de l'Équitable en quatre catégories de renseignements :

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Contexte de base pour chaque cas. | <ul style="list-style-type: none"> Énumération des éléments clé ayant une influence sur les décisions prises en tarification. | <ul style="list-style-type: none"> Indication de la décision probable relative à la tarification pour un cas précis et ne ne garantit pas qu'une offre peut être faite. Les décisions réelles reposeront sur les évaluations de toutes les sources de renseignements nécessaires pour chaque proposante ou proposant selon son cas individuel. | <ul style="list-style-type: none"> Précisions sur les renseignements qui peuvent être obtenus pour des affections médicales, comme la déclaration du médecin traitant (DMT), et fournis par la proposante ou le proposant dans les cas d'ordre non médical. Si ces renseignements ne sont pas fournis ou sont incomplets, des rapports subséquents pourraient être exigés et retarder la décision de tarification. |

En plus des renseignements concernant les risques médicaux et les risques non médicaux, le guide comporte également le [Tableau des preuves d'assurabilité exigées](#), les [Lignes directrices sur la tarification financière](#), les [Lignes directrices concernant les immigrants récents et les résidents temporaires](#), les [Catégories de tarification privilégiée](#), les renseignements sur le statut tabagique pour chaque produit, ainsi que des renseignements au sujet du Programme incitatif d'abandon du tabac.



| | |
|---|---|
| À propos de l'Assurance vie Équitable du Canada ...3 | Fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire..... 17 |
| À propos de ce guide3 | Hépatite..... 18 |
| Renseignements utiles à recueillir pour toutes les affections médicales5 | Hypertension 18 |
| Propositions préliminaires.....5 | Infarctus du myocarde ou crise cardiaque Thrombose coronaire..... 18 |
| Décisions de tarification5 | Maladie congénitale du cœur..... 19 |
| Vous avez des questions?5 | Maladie coronarienne 19 |
| Risques médicaux6 | Maladie d'Alzheimer..... 19 |
| Accident vasculaire cérébral6 | Maladie de Crohn 20 |
| Accidents ischémiques transitoires (AIT).....6 | Polyarthrite rhumatoïde..... 20 |
| Anémie.....6 | Pontage coronarien 20 |
| Anévrisme7 | Pression artérielle élevée 20 |
| Angine de poitrine7 | Proposants âgés 21 |
| Angoisse8 | Tableau taille et poids lignes directrices de tarification 22/23 |
| Antécédents familiaux8 | Risques non médicaux24 |
| Apnée du sommeil ou apnée obstructive du sommeil (AOS)9 | Aviation commerciale24 |
| Artériosclérose.....9 | Aviation privée24 |
| Asthme10 | Aviation sportive24 |
| Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).....10 | Conduite automobile25 |
| Cancer : carcinome basocellulaire.....11 | Course de véhicule automobile.....25 |
| Cancer : de la peau à la limite de la malignité11 | Escalade.....25 |
| Cancer : de la peau malin11 | Plongée avec scaphandre autonome26 |
| Cancer : de la prostate.....12 | Voyage missionnaire.....26 |
| Cancer : de la thyroïde.....12 | Autres guides26 |
| Cancer : du poumon12 | Tableau des preuves d'assurabilité exigées26 |
| Cancer : du sein.....13 | Lignes directrices sur la tarification financière.....26 |
| Cancer : leucémie13 | Lignes directrices concernant les immigrants récents et les résidents temporaires.....26 |
| Chirurgie bariatrique13 | Définitions relatives au statut tabagique27 |
| Colite ulcéreuse.....14 | Produits Équation Génération, Équimax et AMG ÉquiVivre.....27 |
| Consommation ou abus d'alcool.....14 | Régimes et avenants d'assurance temporaire.....27 |
| Crises.....14 | Catégories de tarification privilégiée27 |
| Dépression15 | Programme incitatif d'abandon du tabac28 |
| Diabète.....15 | Comment ça fonctionne28 |
| Drogues illicites et marijuana.....16 | Vous avez des questions?28 |
| Emphysème16 | |
| Endobrachyœsophage16 | |
| Épilepsie ou crises épileptiques.....17 | |

RENSEIGNEMENTS UTILES À RECUEILLIR POUR TOUTES LES AFFECTIONS MÉDICALES

1. Date du diagnostic
2. Âge de la proposante ou du proposant à la date du diagnostic
3. Médicaments, posologie et traitements associés prescrits
4. Toute absence du travail
5. Toute hospitalisation
6. Coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement
7. Date et résultats du dernier suivi et des derniers examens médicaux
8. Tout test ou examen en attente
9. Statut tabagique actuel
10. Date et précisions de la dernière apparition des symptômes, des épisodes ou des poussées actives

L'importance de fournir des renseignements complets

Fournir des renseignements complets dans le cas des risques médicaux et non médicaux permet d'assurer une évaluation précise de façon aussi rapide et efficace que possible. Lorsque des questionnaires sont exigés, ils doivent dûment remplis et signés par la proposante ou le proposant. Voici les questionnaires disponibles :

- Questionnaire relatif à la consommation d'alcool
- Questionnaire relatif aux troubles nerveux
- Questionnaire relatif à l'aviation
- Questionnaire relatif à l'escalade
- Questionnaire financier confidentiel - Couverture individuelle
- Questionnaire relatif à l'usage de drogues
- Questionnaire relatif aux conditions respiratoires
- Questionnaire relatif aux sports motorisés
- Questionnaire relatif aux voyages et à la résidence à l'étranger
- Questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome
- Questionnaire relatif au parachutisme et au saut en chute libre

PROPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Des propositions préliminaires peuvent être présentées afin de déterminer l'admissibilité avant de prendre les mesures nécessaires à la tarification des preuves médicales. Lorsque vous présentez des propositions préliminaires, veuillez inscrire « proposition préliminaire » dans la section intitulée « Directives spéciales » de la proposition d'assurance, et fournir les coordonnées complètes y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la médecin ou du médecin traitant.

DÉCISIONS DE TARIFICATION

L'équipe de tarification acceptera, refusera ou reportera la décision. Si la proposition d'assurance de votre cliente ou de votre client est :

- **ACCEPTÉE**, une offre d'assurance est présentée selon une catégorie de risques standard ou une catégorie de risques aggravés. La catégorie de risques aggravés (souvent désignée comme une catégorie de risques spéciale) peut donner lieu à une tarification qui augmentera les primes d'un multiple allant de 150 % à 350 %.
- **REFUSÉE**, la proposante ou le proposant a été jugé comme étant non assurable et aucune offre d'assurance n'a été présentée.
- **REPORTÉE**, une offre d'assurance peut être considérée au titre de la proposante ou du proposant à une date ultérieure.

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS?

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en assurance individuelle de l'Équitable.

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|---|--|--|
| <p>Accident vasculaire cérébral</p> <p>Un accident vasculaire cérébral est caractérisé par une interruption du débit sanguin dans toute partie du cerveau causant un dommage permanent. Il peut être causé par une hémorragie, un événement vasculaire ou une thrombose.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel et âge à l'apparition • nombre d'épisodes • type de traitement • statut tabagique • étendue de tout effet résiduel ou déficit neurologique • tout facteur de risque pour la santé supplémentaire | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge à l'apparition • la cause • le type <p>Dans un délai d'un an suivant l'accident vasculaire cérébral :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposants plus jeunes • épisodes récents • statut tabagique • autres facteurs de risque pour la santé, p. ex. diabète, hypertension | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dates et cause de chaque épisode • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • absence du travail en raison de cette affection • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Accident ischémique transitoire (AIT)</p> <p>Un AIT se caractérise par un épisode de dysfonction neurologique ne durant pas plus que 24 heures et qui ne laisse aucun effet résiduel ou dommage permanent.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de traitement • médicaments et posologie prescrits • nombre d'épisodes • statut tabagique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge • la date des crises • le statut tabagique <p>Dans un délai de six mois suivant la crise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • autres facteurs de risque pour la santé, p. ex. diabète, hypertension | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date et nombre de crises • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • absence du travail en raison de cette affection • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Anémie</p> <p>L'anémie ferriprive est la forme la plus courante et se définit par une réduction des globules rouges dans le sang.</p> <p>L'anémie est parfois causée par une perte de sang, un manque de la moelle osseuse pour produire un nombre suffisant de globules, ou une destruction prématurée des globules.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type d'anémie • cause de l'anémie si connue • précisions sur tous les examens effectués ou toute recommandation d'une consultation avec des spécialistes (inclure des dates, le nom des tests et des spécialistes consultés) • résultats du profil sanguin • traitement actuel et passé • type de médicament pris actuellement ou antérieurement • tout handicap coexistant | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • privilégiée, privilégiée plus, standard jusqu'au refus <p>Anémie ferriprive, examen complet et aucune affection sous-jacente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement au taux standard <p>Anémie aplasique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement un refus <p>Anémie hémolytique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 200 % | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type et cause de l'anémie • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements prescrits • précisions sur la surveillance continue de l'affection, p. ex. du profil sanguin • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|--|--|
| <p>Anévrisme</p> <p>Les troubles de l'aorte comprennent les renflements (anévrismes) dans les endroits faibles de la paroi et la séparation des couches de sa paroi (dissection). Ces troubles peuvent être immédiatement fatals, mais ils prennent souvent plusieurs années à se développer. Des anévrismes peuvent également se développer dans d'autres artères.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type et endroit de l'anévrisme • date où il s'est produit • cause de l'anévrisme • taille et stabilité de l'anévrisme • état actuel • contrôle de la pression artérielle • Antécédents de tabagisme • Traitement actuel | <p>Six mois après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération individuelle <p>Petit anévrisme abdominal sans chirurgie, taille de cinq cm ou moins s'étant maintenu au cours des trois dernières années ou depuis le diagnostic (s'il s'agit d'une période plus courte); stable avec un suivi régulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 à 200 % <p>Gros anévrisme abdominal sans chirurgie, cinq cm ou plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Anévrisme abdominal avec chirurgie, minimum de six mois après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 à 250 % <p>Petit anévrisme cérébral sans chirurgie, taille d'un cm, minimum de six mois après le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarification déterminée selon les antécédents d'anévrisme <p>Gros anévrisme cérébral, sans chirurgie, taille de 1,9 cm ou plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Anévrisme cérébral avec chirurgie (de six mois à deux ans après chirurgie) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement au taux de risques aggravés; si aucune complication, considération possible au taux standard <p>Anévrisme thoracique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement un refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type, cause et taille de l'anévrisme • date du diagnostic • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements prescrits • précisions sur les examens de surveillance • précisions sur les modifications du style de vie • précisions sur les habitudes de tabagisme actuelles et antérieures • précisions sur le contrôle de la tension artérielle et des lipides • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Angine de poitrine</p> <p>L'angine, également nommée angine de poitrine, se caractérise par une douleur à la poitrine temporaire ou une sensation de pression qui survient lorsque le muscle du cœur ne reçoit pas assez d'oxygène.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Maladie coronarienne | <p>Report de six mois après le traitement initial, puis présenter une proposition préliminaire.</p> | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Angoisse</p> <p>Les troubles d'angoisse comportent un état de détresse, une nervosité chronique mais qui fluctue et se veut inopportunément grave au titre des circonstances de la personne.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • gravité actuelle de l'état • traitement actuel • médicaments et posologie prescrits • diagnostic d'un cas chronique ou sévère d'angoisse • nombre de crises • toute affection médicale ou psychiatrique coexistante (dépression, stress, etc.) • antécédents d'abus d'alcool ou d'autres drogues | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • la fréquence <p>Angoisse légère :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard (une seule crise), jusqu'à 150 % (plus d'une crise) <p>Angoisse modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 150% (une seule crise), de 150 % à 200 % (plus d'une crise) <p>Angoisse grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % et plus (une seule crise) jusqu'à 200 % et plus (plus d'une crise) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif aux troubles nerveux <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements prescrits, et l'observance du traitement • impact de l'angoisse sur le style de vie et les activités quotidiennes • fréquence des symptômes • précisions sur l'absence du travail en raison de cette affection • antécédents de troubles psychiatriques, y compris les hospitalisations ou les admissions à une clinique pour toute affection psychiatrique • précisions sur toute consultation, notamment les dates et la durée • précisions sur les facteurs médicaux coexistants • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Antécédents familiaux</p> <p>Antécédents familiaux de maladie polykystique des reins, de maladie de Huntington, de maladie du neurone moteur, du cancer du côlon et du sein des parents au premier degré (y compris les enfants) peut constituer une préoccupation aux fins de tarification.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type de maladie • âge à l'apparition des membres de la famille • plusieurs membres de famille souffrant de cette maladie | <p>Antécédents familiaux associés au cancer du sein, au cancer du côlon, à la maladie de Huntington, à la maladie du neurone moteur ou à la maladie polykystique constitue une préoccupation et d'autres preuves peuvent être exigées.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • remplir toute la section des antécédents familiaux de la proposition, y compris le type de maladie, le lien avec la proposante et le proposant et l'âge à l'apparition • résultats de tout dépistage du cancer du côlon ou du sein |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|--|---|
| <p>Apnée du sommeil ou apnée obstructive du sommeil (AOS)</p> <p>L'apnée du sommeil est un trouble grave qui se caractérise par des interruptions répétitives et brèves de la respiration dérangeant le sommeil et réduisent temporairement la quantité d'oxygène et augmentent la quantité du dioxyde de carbone dans le sang.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge de la proposante ou du proposant • type d'apnée (obstructive, mixte ou centrale) • gravité actuelle de l'affection • traitement prescrit • observance du traitement prescrit • date de la dernière étude du sommeil • taille et poids de la proposante ou du proposant • toute affection médicale coexistante (hypertension artérielle, arythmie, etc.) • antécédents de tabagisme | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • le traitement • l'âge <p>Apnée légère, aucune complication actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>Apnée modérée, aucune présence de complication, traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 à 175 % <p>Aucun traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • âge de 64 et moins : de 175 % jusqu'au refus • âge de 65 ans et plus : de 150% jusqu'au refus <p>Apnée grave, traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % jusqu'au refus <p>Apnée grave, aucun traitement en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dates et résultats de toutes les études du sommeil • type et gravité de l'apnée • médicaments, posologie et traitements prescrits, et l'observance du traitement • modifications du style de vie prescrites (actuelles et antérieures) • précisions sur l'absence du travail en raison de cette affection • statut tabagique actuel et antérieur • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Artériosclérose</p> <p>L'artériosclérose est une affection qui se caractérise par des dépôts gras se développant dans les parois des moyennes et grosses artères, causant une réduction ou un blocage du débit sanguin.</p> | <p>Voir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • maladie coronarienne • accident vasculaire cérébral (AVC) • accident ischémique transitoire (TIA) | <p>Report jusqu'à six mois après le traitement initial et présentation d'une proposition préliminaire</p> | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|---|---|---|
| <p>Asthme</p> <p>L'asthme est une affection où les voies respiratoires se rétrécissent - de façon réversible la plupart du temps - en réponse à certain stimuli.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • date à laquelle le diagnostic d'asthme a été posé • gravité des symptômes de l'asthme • fréquence des symptômes et moment où ils se produisent • précisions sur les médicaments et posologie prescrits • visites à l'hôpital en raison de cette affection • observance du traitement prescrit et médicamenteux • restrictions des activités de la vie quotidienne • antécédents de tabagisme • handicap coexistant comme une BPCO, des troubles psychiatriques, un abus ou usage d'alcool, une maladie coronarienne, etc. | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge • la gravité • la fréquence • le statut tabagique <p>Asthme léger ou intermittent - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 150 % <p>Asthme modéré - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % à 200 % <p>Asthme grave - de 6 à 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 200 à 250 % <p>Asthme intermittent ou léger persistant - de plus de 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement au taux standard <p>Asthme modéré - plus de 75 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • habituellement un refus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fumer en plus de souffrir de l'asthme peut augmenter les taux | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif aux conditions respiratoires <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • symptômes • augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes depuis le diagnostic • dates, raison et résultats de toute hospitalisation liée ou de visite à l'urgence • Dates de toute absence au travail en raison de cette affection • médicaments, posologie et traitements prescrits • respect du traitement mentionné ci-dessus • exigences de modifications du style de vie ou recommandations (abandon du tabac) • résultats de tous les examens fonctionnels respiratoires • description du niveau d'activité actuel • antécédents familiaux de maladie respiratoire grave • statut tabagique • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)</p> <p>La bronchopneumopathie chronique se caractérise par une obstruction persistante des voies respiratoires se produisant avec l'emphysème, la bronchite chronique ou les deux. Elle peut progresser et se détériorer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • antécédents de tabagisme et statut tabagique actuel • gravité des symptômes • traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • l'âge • le statut tabagique (actuel et au cours de la dernière année) • les facteurs de risque supplémentaires pour la santé, comme une maladie coronarienne, la bronchite ou de l'emphysème <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'au refus <p>Faible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 150 % <p>Modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 175 % à 250 % <p>Grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif aux troubles respiratoires • date du diagnostic • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations ou traitements en salle d'urgence • date et résultats du dernier examen fonctionnel respiratoire • Statut tabagique actuel et antérieur • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|--|---|
| <p>Cancer : carcinome basocellulaire</p> <p>Le carcinome basocellulaire est un cancer qui se forme dans la couche superficielle de la peau (épiderme). Il ne se propage que très rarement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge au diagnostic et âge actuel type de cancer et grade type de traitement et date de la fin du traitement toute récurrence ou tout cancer secondaire toute complication grave du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le nombre d'épisodes la gravité <p>Premier épisode :</p> <ul style="list-style-type: none"> habituellement au taux standard, à condition qu'il ait été complètement excisé et aucune récurrence <p>Épisodes récurrents :</p> <ul style="list-style-type: none"> selon la gravité | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> date du diagnostic date de l'excision ou du traitement antécédents d'autres lésions cutanées date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la peau à la limite de la malignité</p> <p>Comprend le carcinome basocellulaire, le nævus dysplasique et le lentigo malin.</p> | <ul style="list-style-type: none"> nombre et type de lésions aucune invasion d'autres tissus type et date du traitement toute récurrence facteurs de risque permanents antécédents familiaux de cancer de la peau | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge le nombre de lésions le type le traitement prescrit <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard (moins de 10 lésions) jusqu'au refus (plus de 10 lésions) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type de lésions cutanées état du rétablissement coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et traitements associés, y compris les dates du début et de la fin précisions sur toutes les complications date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la peau malin</p> <p>Le plus grave de tous les cancers de la peau est le mélanome malin. Les personnes plus âgées et au teint pâle sont plus à risque.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de cancer de la peau pathologie, notamment la profondeur et l'épaisseur de la tumeur type et la date de la fin du traitement toute récurrence facteurs de risque permanents | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type la profondeur et l'épaisseur de la tumeur le traitement la date du traitement le rapport de pathologie (requis pour les tarifications tentatives) <p>Dans un délai d'un an suivant le diagnostic ou le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> diagnostic précis coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin précisions sur toute complication date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|--|---|
| <p>Cancer : de la prostate</p> <p>Le cancer de la prostate constitue le cancer le plus commun chez les hommes et l'une des causes principales de décès liées au cancer.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • pathologie, notamment le stade et la cote selon la classification de Gleason • type de traitement • toute récurrence ou métastase • toute complication grave du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type • la stadification • la cote selon la classification de Gleason <p>Néoplasie intra-épithéliale Prostatique à évolution lente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>Proposants de moins de 50 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Proposants dans un délai d'un an suivant le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • test d'ASP <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type, stade et pathologie du cancer • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : de la thyroïde</p> <p>Le cancer de la thyroïde est commun chez les femmes et comporte un taux de succès de traitement élevé.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type de cancer de la thyroïde (papillaire, folliculaire etc.) • pathologie • type de traitement • âge de la proposante ou du proposant • réponse au traitement ou toute complication | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic • le type • la stadification <p>Dans un délai de cinq ans suivant le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'au refus <p>Cinq ans après le traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard dans la plupart des cas | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapport de pathologie • type et stade du cancer • état du rétablissement • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur toutes les complications • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : du poumon</p> <p>Le cancer du poumon est la principale cause de décès liée au cancer chez les hommes et les femmes. Il survient habituellement de 45 à 70 ans. Il existe un fort lien entre le cancer du poumon et le tabagisme.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type et stade du cancer • type de traitement • toute rechute ou propagation à d'autres organes • toute complication grave du traitement | <p>Propositions considérées si :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tous les traitements sont terminés • la proposante ou le proposant ne fume pas • aucune récurrence <p>Propositions préliminaires suggérées</p> <p>Cancers à évolution lente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sans envahissement ganglionnaire sont considérés après un report de trois mois • avec envahissement ganglionnaire sont considérés suivant un report de cinq ans <p>Toute forme de métastase :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type, stade et pathologie du cancer • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • statut tabagique actuel et antérieur • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|---|---|---|
| <p>Cancer : du sein</p> <p>Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus commun chez les femmes après le cancer de la peau, et parmi les cancers, constitue la deuxième cause de décès chez les femmes après le cancer du poumon.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de cancer et stade • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récidive ou tout cancer secondaire • toute complication grave du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge au diagnostic • le stade de la maladie • le traitement prescrit <p>Propositions préliminaires suggérées</p> <p>Carcinome in situ : (non envahissant) bénéficie de taux moins élevés et peut être considéré après avoir complété le traitement</p> <p>Tous les autres types et toute stadification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report de deux ans ou plus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type et stade du cancer du sein • toute atteinte ganglionnaire • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Cancer : leucémie</p> <p>Les leucémies constituent des cancers malins des globules pouvant être chroniques ou aigus.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de leucémie et stadification • type de traitement et date de la fin du traitement • toute récidive ou tout cancer secondaire • toute complication grave du traitement | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type • la stadification <p>Une proposition préliminaire peut être justifiée afin de déterminer si nous pouvons accepter une proposition.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • type et stade de la leucémie • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Chirurgie bariatrique</p> <p>La chirurgie bariatrique modifie l'estomac, l'intestin ou les deux afin de produire une perte de poids. La chirurgie bariatrique est quelques fois désignée sous le nom de gastroplastie.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • poids avant la chirurgie • raison de la chirurgie (restrictive ou malabsorptive) • toute autre affection (comme le diabète, l'hypertension artérielle ou la maladie du cœur) • toute complication pendant ou après la chirurgie • perte de poids avant la chirurgie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type de chirurgie • la gravité • le traitement • le poids avant et après le traitement <p>Chirurgie restrictive jusqu'à trois ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % à 175 % <p>Chirurgie malabsorptive moins d'un an après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Un an à cinq ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 % <p>Plus de cinq ans après la chirurgie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 150 % <p>L'une ou l'autre des chirurgies, plus de 10 ans après la chirurgie, poids stable, aucune complication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type de chirurgie • date de la chirurgie • complications pendant ou après la chirurgie • poids avant la chirurgie et poids actuel • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|---|--|
| <p>Colite ulcéreuse</p> <p>La colite ulcéreuse désigne une maladie chronique où le gros intestin devient enflammé et ulcéré.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • gravité des symptômes et de la maladie • date de la dernière poussée active • médicaments et posologie prescrits • hospitalisations et visites en salle d'urgence • stabilité du poids ou perte de poids • complications médicales ou autres facteurs de risque pour la santé | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge actuel • l'âge au diagnostic • la gravité de la maladie <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % jusqu'au refus <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposant plus jeunes : taux plus élevés <p>Dans un délai de six mois suivant la chirurgie, la poussée active ou le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • résultats et dates de la coloscopie • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • observance du traitement • date du dernier épisode ou de la poussée active • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Consommation ou abus d'alcool</p> <p>La consommation d'alcool considérée comme un abus actuel ou passé, un risque de dépendance et une consommation excessive.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • consommation d'alcool déclarée • diagnostic d'abus ou de dépendance • période d'abstinence ou de consommation modérée • rechutes • membre d'un groupe d'entraide relatif à la consommation d'alcool • traitement avec médicaments | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge • le temps écoulé depuis la dernière utilisation • les facteurs comorbidité <p>Après cinq ans suivant le rétablissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération au taux standard ou de risques aggravés <p>Rétablissement de moins de cinq ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération individuelle <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consommation d'alcool combinée à un diagnostic d'alcoolisme ou de dépendance à l'alcool est refusée. | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif à la consommation d'alcool • DMT • DCA • profil sanguin <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • précisions sur tout aspect favorable, comme un emploi stable, la participation à un groupe d'entraide, l'abstinence complète, aucune rechute • précisions de tout traitement s'y rattachant, dans un hôpital ou un centre de réadaptation • résultats de tout examen de la fonction hépatique ou de maladie cardiaque • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements prescrits • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Crises</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Épilepsie ou crises épileptiques | | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|---|--|---|
| <p>Dépression</p> <p>La dépression désigne un sentiment de tristesse d'une intensité qui compromet le fonctionnement. Elle peut suivre une perte récente ou autre événement triste, mais est démesurée par rapport à cet événement et dure au-delà d'une période appropriée.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité • toute hospitalisation ou tout traitement dans un autre établissement médical • toute tentative de suicide ou idée suicidaire • type de traitement, y compris le nombre et le type de médicaments • toute perte de travail • tout usage de drogue illicite | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge (taux plus élevés pour les proposant plus jeunes) • la gravité de la maladie <p>Dans un délai de six mois suivant le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune considération <p>Moins de 40 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus probable <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 200 % jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats de la dernière consultation liée à la maladie cardiaque |
| <p>Diabète</p> <p>Le diabète est un trouble métabolique causé par une production inadéquate ou utilisation d'insuline.</p> <p>Le diabète de type de 1 (D1D) requiert de l'insuline et est habituellement diagnostiqué à un jeune âge.</p> <p>Le diabète de type 2 (DNID) est habituellement diagnostiqué à un stade de la vie plus avancé et également appelé le diabète de l'adulte. Le traitement consiste en un médicament pris par voie orale ou il peut également être contrôlé par le régime alimentaire et l'exercice.</p> <p>Le diabète gestationnel se produit pendant la grossesse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • type de diabète • degré de contrôle • tout autre facteur de risque pour la santé, p. ex. hypertension artérielle, taille et poids, statut tabagique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge actuel • l'âge au diagnostic • le type de diabète • le degré de contrôle • tout autre facteur de risque pour la santé, p. ex. hypertension artérielle, taille et poids, statut tabagique <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 150 % jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT • profil sanguin testant le HgBA1C • urine et test pour la microalbumine <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • précisions sur le système surveillant le taux sucre • date et résultats du dernier suivi médical • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement Le siège social commandera la DMT si nécessaire |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|---|--|
| <p>Drogues illicites et marijuana</p> <p>Comprend tout usage actuel ou antérieur de cocaïne, d'héroïne, d'ecstasy, d'amphétamines ou de barbituriques et toute dépendance au Percocet, Oxycontin ou Oxycocet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type et quantité de l'usage actuel de drogues • antécédents d'usage de drogues et la date de la dernière utilisation • emploi • antécédents familiaux d'usage de drogues • antécédents de dépression • antécédents de comportement criminel • âge • dossier de conduite (DCA) | <p>Usage actuel de drogues, autre que la consommation occasionnelle de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Usage antérieur d'ecstasy ou de cocaïne et usage occasionnel de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Consommation quotidienne de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération individuelle <p>Usage occasionnel de marijuana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération possible aux taux standards pour personnes non fumeuses <p>Usage de marijuana jusqu'à deux fois par semaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération possible aux taux standards pour personnes non fumeuses <p>De cinq à sept ans après le dernier usage de cocaïne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération individuelle aux taux standards | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif à l'usage de drogues • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • précisions sur l'usage actuel et antérieur de drogues et traitements, y compris les dates • précisions sur les hospitalisations liées à l'usage de drogues ou les visites en salle d'urgence • précisions sur les accusations liées à la drogue • antécédents de dépression, de tentatives de suicide ou d'idées suicidaires • date et résultat du dernier suivi médical |
| <p>Emphysème</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) | | |
| <p>Endobrachyoesophage</p> <p>L'endobrachyoesophage est caractérisé par un changement métaplasique des cellules muqueuses recouvrant la partie inférieure de l'oesophage en raison d'une blessure, souvent causé par le reflux acide chronique dans l'oesophage.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • test effectué (endoscopie, biopsie) • état actuel | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • le traitement | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéros de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • date et résultats du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|---|---|--|
| <p>Épilepsie ou crises épileptiques</p> <p>L'épilepsie est un terme englobant de nombreux types de troubles de crises : les crises épileptiques partielles (focales), l'épilepsie généralisée, les crises épileptiques généralisées.</p> | <ul style="list-style-type: none"> cause et type de crises degré de contrôle avec ou sans médicament âge actuel âge au diagnostic fréquence des crises date de la dernière crise observance des médicaments prescrits, de la posologie et des traitements s'y rattachant | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge actuel l'âge au diagnostic le type et la fréquence des crises (ou crises épileptiques) <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard jusqu'au refus <p>Aucune crise épileptique pendant sept ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> considération au taux standard | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DMT possible <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> diagnostic précis, p. ex. absence épileptique (petit mal), épilepsie atonique, crise myoclonique, crise de grand mal, crise partielle simple, crise partielle complexe (psychomoteur) coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin absence du travail en raison de cette affection impact sur les activités et le style de vie date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire</p> <p>La fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire sont caractérisés par des décharges électriques très rapides qui font que l'oreillette se contracte très rapidement, dont certains des signaux électriques atteignant les ventricules et faisant en sorte qu'elles se contractent plus rapidement et moins efficacement qu'à l'habitude.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel date du diagnostic de la fibrillation auriculaire ou du flutter auriculaire, l'âge du client au moment du début de cette affection nombre de fois que cela se produit type d'examen ou de traitement toute affection ou maladie du cœur coexistante chronique ou paroxystique | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge la gravité la fréquence <p>Affection récemment diagnostiquée :</p> <ul style="list-style-type: none"> report ou refus <p>Bon contrôle – moins de quatre crises par année, aucune affection sous-jacente, 60 ans et moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard jusqu'à 150 % <p>Bon contrôle – moins de quatre crises par année, aucune affection sous-jacente, plus de 60 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 175 % <p>Affection chronique qui requiert un traitement, 60 ans et moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 150 à 200 % <p>Affection chronique qui requiert un traitement, plus de 60 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 200 à 250 % | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin observance du traitement date et résultats de la dernière consultation cardiaque, le cas échéant, ou du dernier suivi médical |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|---|---|
| <p>Hépatite</p> <p>L'hépatite se caractérise par une inflammation du foie se présentant à la fois sous forme aiguë ou chronique. L'hépatite aiguë découle d'une infection virale, comprenant l'hépatite A, B, C et E, ou du dommage causé par la drogue ou les toxines telles que l'alcool.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • type d'hépatite et date du diagnostic • état actuel, y compris toute infection récente ou prolongée • tout dommage au foie ou autre organe • traitement actuel et historique du traitement ou biopsie du foie • antécédents de tout usage de drogues intraveineuses | <p>Antécédents d'hépatite A :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>État de porteur d'hépatite B sans aucune infection et profil sanguin normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux de 175 %. Aucune considération ne peut être accordée dans le cas des bébés et des enfants. <p>Infection actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report jusqu'au refus <p>Hépatite C :</p> <ul style="list-style-type: none"> • considération si asymptomatique et état de santé actuel excellent. <p>Coinfection par l'hépatite B et l'hépatite C :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus <p>Preuve de dommage au foie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus probable | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • profil sanguin comprenant un dépistage actuel de l'hépatite, à l'exception d'antécédents d'hépatite A • possiblement une DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type d'hépatite et si état de porteur seulement • la façon dont elle a été contractée • tout test du foie, y compris une échographie, un tomogramme, une biopsie du foie, y compris les dates et les résultats • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Hypertension artérielle</p> <p>L'hypertension artérielle se caractérise par une élévation durable de la tension artérielle au-dessus du niveau considéré acceptable selon l'âge et le sexe de la personne.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel et âge à l'apparition • type de traitement • tout autre facteur de risque cardiaque • lectures actuelles de la tension artérielle • antécédents familiaux de maladie cardiaque • taille et poids • statut tabagique | <p>Habituellement au taux standard pour une lecture de la tension artérielle dont les résultats sont normaux et sans facteur de comorbidité.</p> | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • examen paramédical <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • observance du traitement • date et résultats de la dernière consultation cardiaque, le cas échéant, ou du dernier suivi médical |
| <p>Infarctus du myocarde ou crise cardiaque ou thrombose coronaire</p> <p>Dommage permanent d'une partie du muscle du cœur en raison d'un apport d'oxygène et d'un débit coronarien inadéquats.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité de la crise ou de la maladie et combien de vaisseaux sont impliqués • type de traitement • médicaments et posologie prescrits • statut tabagique • étendue des effets résiduels ou dommage permanent • tout facteur de risque pour la santé supplémentaire | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge à l'apparition • la cause • la gravité <p>Proposition préliminaire suggérée</p> <p>Dans un délai de six mois suivant l'épisode ou la crise y compris la date de traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune considération <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> • statut tabagique • facteurs de comorbidité • épisodes récents • proposants plus jeunes (de 40 ans et moins, refus probable) | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT et antécédents cardiaques complets <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dates et nombre de crises et de vaisseaux impliqués • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et autres traitements prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les hospitalisations s'y rattachant ou les visites en salle d'urgence • date et résultats de la dernière consultation liée à la maladie cardiaque |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|---|--|
| <p>Maladie congénitale du cœur</p> <p>Plusieurs malformations du cœur. Toutes varient en gravité et traitement.</p> | <p>Les facteurs importants sont déterminés selon le nombre de problèmes congénitaux du cœur à considérer. Il est recommandé d'envoyer un courriel à l'adresse indnewbus@equitable.ca en prenant soin d'y inclure les détails de la maladie du cœur et tout traitement ou toute chirurgie s'y rattachant.</p> | | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type du trouble congénital • précisions sur toute chirurgie, tout traitement ou médicament |
| <p>Maladie coronarienne</p> <p>La maladie coronarienne est une affection caractérisée par un blocage partiel ou complet de la circulation sanguine au muscle du cœur.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité, nombre de vaisseaux touchés • tout problème résiduel, état actuel • traitement, chirurgie, médicaments • statut tabagique • facteurs de comorbidité, p. ex. hypertension artérielle, diabète | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge (taux plus élevés pour les proposants plus jeunes) • la gravité de la maladie <p>Dans un délai de six mois suivant le diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune considération <p>Moins de 40 ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus probable <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 200 % jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • impact sur les activités et le style de vie • date et résultats de la dernière consultation liée à la maladie cardiaque |
| <p>Maladie d'Alzheimer</p> <p>La démence de type Alzheimer est une maladie touchant les personnes âgées et la prévalence augmente avec l'âge. Cette maladie entraîne une grave perte de la fonction intellectuelle. La démence est grave et graduelle. Les premiers symptômes consistent en une perte de mémoire, particulièrement des oublis d'événements récents, et une diminution de l'efficacité au travail et à la maison.</p> | | <p>Cas présumés ou actuels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|---|--|
| <p>Maladie de Crohn</p> <p>Une maladie chronique inflammatoire qui peut toucher toute partie de la voie gastro-intestinale. Elle peut comprendre des problèmes d'ulcération ou de malabsorption.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge au diagnostic et âge actuel • gravité du dernier épisode • toute hospitalisation ou chirurgie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'âge (taux plus élevés pour les proposant plus jeunes) • la gravité de la maladie <p>Diagnostic reçu il y a moins d'un an :</p> <ul style="list-style-type: none"> • report <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard (pour une rémission de plus de cinq ans), jusqu'au refus | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilité du poids • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • médicaments, posologie et traitements associés prescrits, y compris les dates du début et de la fin • précisions sur les résultats des chirurgies s'y rattachant • date et résultats de la dernière coloscopie et du dernier suivi médical |
| <p>Polyarthrite rhumatoïde</p> <p>L'arthrite rhumatoïde est une arthrite inflammatoire où les articulations, comprenant habituellement celles des mains et des pieds, sont enflammées, causant de l'enflure, de la douleur et souvent la destruction des articulations.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • gravité actuelle, durée et articulations touchées • traitement actuel, médicaments ou toute chirurgie • toute hospitalisation ou absence du travail • âge à l'apparition • toute complication actuelle • toute affection coexistante • degré de fonctionnement, notamment les activités de la vie quotidienne, la mobilité • tâches liées à l'emploi actuel | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gravité • le traitement <p>Polyarthrite rhumatoïde légère à modérée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard jusqu'à 175 % <p>Polyarthrite rhumatoïde grave :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 % et plus <p>Polyarthrite rhumatoïde progressant rapidement ou fortement incapacitante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus | <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • date du diagnostic • nature des symptômes • depuis le diagnostic, les symptômes sont-ils devenus plus ou moins graves, ou demeurés les mêmes? • dates, raison et résultats de toute hospitalisation liée ou de visite à l'urgence • dates de toute absence au travail en raison de cette affection • médicaments, posologie et traitements prescrits • observance du traitement • coordonnées, notamment le nom au complet, l'adresse et le numéro de téléphone des professionnels médicaux impliqués dans le diagnostic et le traitement • date et résultats du dernier suivi médical |
| <p>Pontage coronarien</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Maladie coronarienne | <p>Report jusqu'à six mois après le traitement initial</p> | |
| <p>Pression artérielle élevée</p> | <ul style="list-style-type: none"> • voir Hypertension artérielle | | |

RISQUES MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|---|---|
| <p>Proposants âgés</p> <p>Les proposants âgés de 65 ans et plus pourraient nécessiter une tarification supplémentaire spécifique à leur âge.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • statut d'emploi • statut tabagique en ce qui concerne tout facteur de risque pour la santé • soutien familial • antécédents de chutes ou d'accidents • usage et type de médicaments • régularité des examens de santé | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la santé et le style de vie de la proposante et du proposant • tout facteur de risque néfaste pour la santé | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • exigences relatives à l'âge et au montant selon le régime et la somme assurée • possiblement une DMT <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • fréquence de l'activité • fréquence des examens de santé • date et résultats du dernier examen de santé |

TABLEAU TAILLE ET POIDS LIGNES DIRECTRICES DE TARIFICATION

Le tableau suivant fournit les lignes directrices en matière de tarification reposant sur la taille et le poids. Il s'applique à tous les adultes, peu importe leur âge ou leur sexe. De légères variantes pourraient s'appliquer.

| TARIFICATION | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 150 % | 175 % | 200 % | 225 % | 250 % | 275 % | 300 % | 325 % | 350 % |
| Taille (pi/po) | Poids (lb) | | | | | | | | |
| 4 pi 10 po | 179 | 185 | 192 | 199 | 207 | 214 | 220 | 224 | 229 |
| 4 pi 11 po | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 222 | 229 | 233 | 239 |
| 5 pi | 191 | 199 | 205 | 213 | 221 | 228 | 235 | 240 | 245 |
| 5 pi 1 po | 199 | 206 | 214 | 222 | 230 | 237 | 244 | 249 | 255 |
| 5 pi 2 po | 204 | 211 | 219 | 227 | 236 | 244 | 250 | 256 | 261 |
| 5 pi 3 po | 212 | 219 | 228 | 236 | 245 | 253 | 260 | 266 | 271 |
| 5 pi 4 po | 220 | 227 | 236 | 245 | 254 | 263 | 270 | 277 | 282 |
| 5 pi 5 po | 226 | 233 | 242 | 251 | 260 | 269 | 277 | 283 | 289 |
| 5 pi 6 po | 234 | 242 | 251 | 260 | 270 | 279 | 287 | 293 | 299 |
| 5 pi 7 po | 239 | 247 | 257 | 266 | 276 | 286 | 294 | 300 | 306 |
| 5 pi 8 po | 248 | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 | 304 | 311 | 317 |
| 5 pi 9 po | 254 | 262 | 272 | 282 | 292 | 303 | 311 | 318 | 325 |
| 5 pi 10 po | 262 | 271 | 282 | 292 | 303 | 313 | 322 | 329 | 336 |
| 5 pi 11 po | 268 | 277 | 288 | 299 | 309 | 320 | 329 | 336 | 343 |
| 6 pi | 277 | 287 | 298 | 309 | 320 | 331 | 340 | 347 | 355 |
| 6 pi 1 po | 283 | 293 | 304 | 315 | 327 | 338 | 348 | 355 | 363 |
| 6 pi 2 po | 293 | 302 | 314 | 326 | 337 | 349 | 359 | 367 | 374 |
| 6 pi 3 po | 302 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 370 | 378 | 387 |
| 6 pi 4 po | 308 | 319 | 331 | 343 | 356 | 368 | 378 | 386 | 395 |
| 6 pi 5 po | 318 | 329 | 341 | 354 | 367 | 379 | 390 | 399 | 407 |
| 6 pi 6 po | 325 | 334 | 348 | 361 | 374 | 387 | 398 | 407 | 415 |

Par exemple :

Si votre taille est de 5 pi 6 po et votre poids 250 lb, vous pourriez obtenir une tarification de 200 % en raison de votre constitution.

TABLEAU TAILLE ET POIDS LIGNES DIRECTRICES DE TARIFICATION

Le tableau suivant fournit les lignes directrices en matière de tarification reposant sur la taille et le poids. Il s'applique à tous les adultes, peu importe leur âge ou leur sexe. De légères variantes pourraient s'appliquer.

| TARIFICATION | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 150 % | 175 % | 200 % | 225 % | 250 % | 275 % | 300 % | 325 % | 350 % |
| Taille (cm) | Poids (kg) | | | | | | | | |
| 147 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 100 | 102 | 104 |
| 150 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 104 | 106 | 108 |
| 152 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 109 | 111 |
| 155 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 113 | 116 |
| 157 | 93 | 96 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 | 116 | 119 |
| 160 | 96 | 100 | 104 | 107 | 111 | 115 | 118 | 121 | 123 |
| 163 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 126 | 128 |
| 165 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | 131 |
| 168 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 | 130 | 133 | 136 |
| 170 | 109 | 112 | 117 | 121 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| 173 | 113 | 116 | 121 | 125 | 130 | 134 | 138 | 141 | 144 |
| 175 | 115 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 141 | 144 | 147 |
| 178 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 142 | 146 | 149 | 153 |
| 180 | 122 | 126 | 131 | 136 | 141 | 145 | 150 | 153 | 156 |
| 183 | 126 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | 161 |
| 185 | 129 | 133 | 138 | 143 | 149 | 154 | 158 | 161 | 165 |
| 188 | 133 | 137 | 143 | 148 | 153 | 159 | 163 | 167 | 170 |
| 191 | 137 | 142 | 147 | 153 | 158 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 193 | 140 | 145 | 150 | 156 | 162 | 167 | 172 | 175 | 179 |
| 195 | 144 | 149 | 154 | 160 | 166 | 172 | 177 | 181 | 184 |
| 198 | 147 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 181 | 185 | 183 |

Par exemple :

Si votre taille est de 168 cm et votre poids 114 kg, vous pourriez obtenir une tarification de 200 % en raison de votre constitution.

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|---|--|---|---|
| <p>Aviation commerciale</p> <p>Ces pilotes comprennent ceux qui participent ou qui travaillent pour les transporteurs aériens de passagers ou de marchandises à l'intérieur de l'Amérique du Nord, à l'épandage agricole, les pilotes de brousse, les vols nolisés, la photographie, les instructeurs de vol, etc.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de vol et heures de vol cumulées nombre d'heures totales en tant que pilote avec les accréditations spéciales type d'aéronef et destinations heures de vol prévues au cours des 12 à 24 prochains mois | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type de vol spécialisé l'expérience en tant que pilote, y compris les heures de vol cumulées par année <p>Échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard jusqu'à 10 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Facteurs défavorables :</p> <ul style="list-style-type: none"> tout facteur de risque pour la santé <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> les clauses d'exclusion spéciale ne sont habituellement pas offertes | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> questionnaire relatif à l'aviation <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de vol spécialisé expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année tout accident survenu |
| <p>Aviation privée</p> <p>Il s'agit de pilotes non professionnels qui effectuent des vols d'affaire ou pour le plaisir.</p> | <ul style="list-style-type: none"> type de vol et heures de vol cumulées nombre d'heures totales en tant que pilote avec les accréditations spéciales type d'aéronef et destinations heures de vol prévues au cours des 12 à 24 prochains mois | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge l'expérience de vol (nombre d'heures) <p>Moins de 26 ans, 100 heures de vol cumulées ou étudiant-pilotes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,50 \$ x cinq ans (dans la plupart des cas) <p>Plus de 26 ans, plus de 100 heures de vol cumulées ou moins de 200 heures de vol prévues au cours des 12 prochains mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> considération au taux standard <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> la clause d'exclusion spéciale peut être offerte | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> questionnaire relatif à l'aviation <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de vol spécialisé expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année tout accident survenu |
| <p>Aviation sportive</p> <p>Comprend le vol récréatif ou sportif comme le vol deltaplane, le vol en avion ultraléger, le parachutisme etc.</p> | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de vol destinations de vol statut d'amateur ou de professionnel antécédents médicaux et style de vie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'activité la fréquence la destination <p>Il est suggéré d'envoyer une demande de renseignements par courriel</p> <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> la clause d'exclusion spéciale peut être offerte la tarification peut varier selon la participation | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> questionnaire relatif à l'aviation ou au parachutisme et au saut en chute libre, ou au passe-temps approprié <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> permis d'aviation détenus type et fréquence de l'aviation sportive expérience globale en tant que pilote en heures de vol cumulées par année membre d'un aéroclub spécialisé tout accident survenu type d'aéronef, y compris de fabrication amateur |

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|--|---|--|
| Conduite automobile | <ul style="list-style-type: none"> nombre et type d'infractions gravité de l'infraction âge actuel âge au moment de l'infraction infractions pour conduite avec facultés affaiblies toute suspension de permis | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'âge actuel la gravité le nombre d'infractions <p>Dans un délai de six mois suivant une infraction pour conduite avec facultés affaiblies ou achèvement de suspension :</p> <ul style="list-style-type: none"> aucune considération <p>Plus de deux infractions pour conduite avec facultés affaiblies :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus dans le cas des proposants plus jeunes tarification plus élevée | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> DCA en plus des questionnaires applicables (p. ex.. usage de drogue, consommation d'alcool, etc.) <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type et validité du permis de conduire dates et précisions sur les infractions dates et précisions sur toute infraction de conduite avec facultés affaiblies pénalités, y compris les contraventions et les suspensions |
| Course de véhicule automobile Comprend la course ARCA, la course d'accélération, la course de vitesse, la voiture de série, etc. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de véhicule type de carburant fréquence des courses vitesse type de parcours antécédents médicaux et style de vie | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type de véhicule le type de carburant la vitesse <p>Les voitures de série, la course de carambolage et l'autocross ou le motocross :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>Échelle pour tous les autres types de course :</p> <ul style="list-style-type: none"> de 2,50 \$ à 10 \$ de plus par tranche de mille dollars | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> questionnaire relatif aux sports motorisés <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> type de véhicule type de carburant utilisé fréquence des courses statut d'amateur ou de professionnel vitesse de course moyenne et maximale |
| Escalade Comprend l'escalade de rocher et de glace. | <ul style="list-style-type: none"> âge actuel type de terrain endroit et hauteur fréquence d'escalade expérience antécédents médicaux et style de vie | <p>Escalade de rocher à l'intérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> taux standard <p>Escalade de rocher de moins de 4 000 mètres (13 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2,50 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Escalade de glace de moins de 4 000 mètres (13 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,50 \$ de plus par tranche de mille dollars <p>Escalade extrême de plus de 7 000 mètres (23 000 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> refus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> la clause d'exclusion spéciale peut être offerte la tarification peut varier selon la participation | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> questionnaire relatif à l'escalade <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> fréquence, hauteur moyenne et endroit d'escalade grimpeuse ou grimpeur solitaire, avec un groupe ou encore avec une instrutrice ou un instructeur endroit d'escalade |

RISQUES NON MÉDICAUX

| DESCRIPTION DES CAS | FACTEURS IMPORTANTS | DÉCISION PROBABLE | EXIGENCES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA TARIFICATION |
|--|---|---|--|
| <p>Plongée avec scaphandre autonome</p> | <ul style="list-style-type: none"> • âge actuel • expérience et certification • profondeur des plongées • fréquence et endroits • participation à des activités de plongée supplémentaires, comme l'exploration de caves, les épaves, etc. • antécédents médicaux et style de vie • antécédents de plongée spécialisée • antécédents d'abus ou d'usage de drogues ou d'alcool | <p>Tarification selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la profondeur • l'endroit des plongées • le type de plongée <p>Plongée à des fins récréatives dans un endroit de villégiature, en eaux libres ou dans des lacs d'une profondeur de moins de 30 mètres (100 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • taux standard <p>Plongée souterraine, plongée sur épave, plongée de recherche et de sauvetage, profondeurs de plus de 30 mètres (100 pieds) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,50 \$ de plus par tranche de mille dollars et plus <p>Nota :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la clause d'exclusion spéciale peut être offerte | <p>Exigences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • questionnaire relatif à la plongée avec scaphandre autonome <p>Renseignements utiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • niveau de certification de plongée • statut d'amateur ou de professionnel • profondeur moyenne de plongée • fréquence et endroit de plongée |
| <p>Voyage missionnaire</p> <p>Les personnes qui voyagent hors du Canada aux fins de travail missionnaire, du maintien de la paix, de diplomatie gouvernementale, journalistique ou d'aide à l'étranger.</p> | | <p>Voyage missionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • non assurable <p>Travail de maintien de la paix, de diplomatie gouvernementale, journalistique et d'aide à l'étranger :</p> <ul style="list-style-type: none"> • refus possible | |

Les exclusions ne sont pas offertes si les passe-temps font partie des tâches professionnelles.

AUTRES GUIDES

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux autres guides.

- [Tableau des preuves d'assurabilité exigées \(n° 1343FR\)](#)
- [Lignes directrices sur la tarification financière \(n° 1527FR\)](#)
- [Lignes directrices concernant les immigrants récents et les résidents temporaires \(n° 1530FR\)](#)

DÉFINITIONS RELATIVES AU STATUT TABAGIQUE

| | |
|--|---|
| <p>Produits Équation Génération^{MD} IV, Équimax^{MD} et AMG ÉquiVivre</p> | <p>Pour être considérée comme une personne non fumeuse, la personne à assurer ne doit pas avoir fait usage de produits comme la cigarette, la pipe, le tabac à chiquer, les produits d'abandon du tabac ou de remplacement du tabac au cours des 12 derniers mois. Un maximum d'un cigare ou d'un cigarillo par mois est autorisé, sous réserve d'un résultat négatif au test de cotinine. Les clients utilisateurs de marijuana, qu'elle soit inhalée ou ingérée, peuvent être admissibles aux taux pour personnes non fumeuses.</p> |
| <p>Régimes et avenants d'assurance temporaire</p> | <p>La tarification privilégiée est offerte pour les sommes assurées de plus de 1 000 000 \$</p> <p>Catégorie 1 - Privilégiée plus pour personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en très bonne santé et non fumeuse n'a pas fumé ni utilisé de produits pour cesser de fumer au cours des 24 derniers mois, et a des antécédents médicaux familiaux plus que favorables. <p>Catégorie 2 - Privilégiée pour personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en bonne santé et non fumeuse, n'a pas fumé ni utilisé de produits pour cesser de fumer au cours des 12 derniers mois, et a des antécédents médicaux familiaux favorables. <p>Catégorie 3 - Personnes non fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en bonne santé et non fumeuse, n'a pas fumé ni utilisé de produits pour cesser de fumer au cours des 12 derniers mois. Un maximum d'un cigare ou cigarillo par mois est autorisé, sous réserve d'un résultat négatif au test de cotinine. Les clients utilisateurs de marijuana, qu'elle soit inhalée ou ingérée, peuvent être admissibles aux taux pour personnes non fumeuses. <p>Catégorie 4 - Privilégiée pour personnes fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en bonne santé et fume la cigarette ou fait usage des produits à base de nicotine. L'évaluation s'effectue selon des critères relatifs à la santé, similaires à ceux de la catégorie 2, privilégiée pour personnes non fumeuses. <p>Catégorie 5 - Personnes fumeuses</p> <ul style="list-style-type: none"> La personne assurée est en santé et fume la cigarette ou fait usage des produits à base de nicotine. <p>Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document <i>Catégories de tarification privilégiée</i> (n° 1345FR).</p> |

PROGRAMME INCITATIF POUR L'ABANDON DU TABAC



Le programme incitatif pour l'abandon du tabac de l'Équitable s'applique aux produits suivants :

- Équation Génération IV
- Équimax
- Régimes et avenants d'assurance temporaire

Ce programme n'est pas offert avec les produits suivants :

- ÉquiVivre
- Avenants d'assurance maladies graves ÉquiVivre

Comment ça fonctionne

Si votre cliente ou votre client arrête de fumer pendant 12 mois consécutifs au cours des deux premières années contractuelles, l'Assurance vie Équitable rembourse la différence entre le montant payé en tant que personne fumeuse et ce que votre client aurait payé en tant que personne non fumeuse, pour un maximum équivalant à une prime mensuelle. L'admissibilité est sous réserve de certaines conditions, y compris un résultat négatif au test de cotinine et une preuve d'assurabilité continue.

Les clients détenant un contrat d'assurance temporaire pourraient passer de la catégorie privilégiée pour personnes fumeuses (catégorie 4) ou de la catégorie personnes fumeuses (catégorie 5) à la catégorie personnes non fumeuses (catégorie 3).

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes en assurance individuelle de l'Équitable. Même si l'Assurance vie Équitable a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la précision des renseignements contenus dans le présent document, le contrat prévaut dans tous les cas.

Tout à fait pour moi.^{MD}

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour les aider à protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert avec vous dans le but de vous offrir des solutions qui présentent un bon rapport qualité-prix et de vous aider à trouver les bonnes solutions pour répondre aux besoins de votre clientèle.

L'Assurance vie Équitable n'est pas une compagnie typique de services financiers. Nous possédons la connaissance, l'expérience et la compétence afin de trouver des solutions qui vous conviennent. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. Comme nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat avec participation et non d'actionnaires, nous pouvons nous concentrer sur vos besoins et vous offrir un service personnalisé, une protection financière et la tranquillité d'esprit.



Assurance vie
Équitable du Canada^{MD}

 L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada  1 800 722-6615  www.equitable.ca/fr

^{MD} indique une marque déposée de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.